

Nestle Nan Expertpro HA 2, mleko modyfikowane po 6 miesiącu, 800 g



Cena: 131,69 zł

Opis słownikowy

Marka	NAN
Postać	proszek
Producent	Nestle
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Nestle Nan Expertpro HA 2, mleko modyfikowane po 6 miesiącu, 800 g

Nestle Nan Expertpro HA 2, mleko modyfikowane po 6 miesiącu – mleko następne przeznaczone dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, które nie są karmione piersią. Posiada unikalną kompozycję zawierającą częściowo hydrolizowane białko (łatwiejsze do strawienia) oraz immunoskładniki (cynk, żelazo, wit. A i C), DHA i ARA (omega-3 i omega-6), a także B. lactis, czyli kultury bakterii.

Skład Nestle Nan Expertpro HA 2, mleko modyfikowane po 6 miesiącu, 800 g

Laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), maltodekstryna, koncentrat białka serwatkowego (z mleka), skrobia ziemniaczana, fosforany wapnia, chlorek magnezu, L-arginina, chlorek potasu, olej rybi, chlorek sodu, L-histydyna, olej z *Mortierella alpina*, witaminy (C, kwas pantotenowy, niacyna, E, B2, A, B1, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-tyrozyna, siarczyn żelaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii *Bifidobacterium lactis*, siarczan miedzi (II), siarczan manganu,

jodek potasu, selenian (VI) sodu.

Zawiera mleko (??cznie z laktoz?) i pochodne ryb.

Wartości odżywcze	w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna	2053 kJ / 490 kcal	281 kJ / 67 kcal
Tłuszcz, w tym:	22,5 g	3,08 g
Kwasy tłuszczowe nasycone	6,2 g	0,85 g
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone	10,5 g	1,44 g
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone	4,1 g	0,56 g
Węglowodany, w tym:	62,5 g	8,54 g
Cukry	37,8 g	5,17 g
Białko	9,3 g	1,27 g
Sól	0,55 g	0,08 g
Witaminy:		
Witamina A	510 µg	69,74 µg
Witamina D	6,8 µg	0,93 µg
Witamina E	9 mg	1,23 mg
Witamina K	37 µg	5,06 µg
Witamina C	80 mg	10,94 mg
Tiamina (B1)	0,5 mg	0,07 mg
Ryboflawina (B2)	1,1 mg	0,15 mg
Niacyna	5,3 mg	0,73 mg
Witamina B6	0,36 mg	0,05 mg
Kwas foliowy	81 µg	11,08 µg
Witamina B12	1,25 µg	0,17 µg
Biotyna	11 µg	1,5 µg
Kwas pantotenowy	5,1 mg	0,69 mg
Składniki mineralne:		
Sód	220 mg	30,08 mg

Potas	420 mg	57,43 mg
Chlor	370 mg	50,59 mg
Wap?	564 mg	77,12 mg
Fosfor	343 mg	46,9 mg
Magnez	50 mg	6,84 mg
?elazo	7,3 mg	0,99 mg
Cynk	4,4 mg	0,6 mg
Mied?	0,37 mg	0,05 mg
Mangan	0,11 mg	0,01 mg
Fluor	?0,06 mg	?0,008 mg
Selen	19 µg	2,6 µg
Jod	70 µg	9,57 µg
Inne:		
Kwas linolowy	3500 mg	479 mg
Kwas ?-linolenowy	440 mg	60 mg
Zawarto?? miarki: 4,56 g; 100 ml gotowego mleka = 3 p?askie miarki proszku (13,68 g) + 90 ml wody.		

Wskazania Nestle Nan Expertpro HA 2, mleko modyfikowane po 6 miesiącu, 800 g

Żywienie niemowląt powyżej 6. miesiąca życia.

Dawkowanie Nestle Nan Expertpro HA 2, mleko modyfikowane po 6 miesiącu, 800 g

Uwaga! Podana poniżej wielko?? porcji jest ?redni?, jak? zjada dziecko w danym wieku zale?nie od indywidualnych potrzeb. Ró?nice mog? dotyczy? równie? liczby posi?ków. Zawsze konsultuj ilo?? posi?ków z lekarzem prowadz?cym.

W tym wieku zgodnie ze schematem ?ywienia niemowl?t dieta dziecka powinna zawiera? tak?e posi?ki inne ni? mleko. Wprowadzanie nowych produktów konsultuj z lekarzem. Je?li zaleci on wcze?niejsze podawanie nowych produktów, zmniejsz odpowiednio ilo?? podawanego mleka.

	7. i 8. miesi?c	9-12 miesi?cy
--	-----------------	---------------

ilość wody w porcji	180 ml	210 ml
liczba miarek* mleka w porcji	6	7
przeciętna liczba karmień dziennie	2-3	2-3

*Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku nie wskazane może prowadzić do odwodnienia organizmu lub niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem. Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C).

Sposób użycia

Przygotowanie mleka Nan Expertpro:

Umyj dokładnie ręce zanim zaczniesz przygotowywać mleko.

Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka.

Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.

Doprowadź wodę pitną do wrzenia i gotuj przez 5 minut; pozostaw do ostygnięcia.

Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.

Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz.

Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku.

Po użyciu umieść miarkę tak, jak pokazano na rysunku.

Zakręć butelkę i potrząśnij nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku.

Zamknij dokładnie puszkę po każdym użyciu i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu (5-25°C). Zawartość zużyj w ciągu 3. tygodni po otwarciu opakowania.

Przeciwwskazania Nestle Nan Expertpro HA 2, mleko modyfikowane po 6 miesiącu, 800 g

Nie stosować u dzieci ze stwierdzoną alergią na białko mleka krowiego.

U niemowląt, u których stwierdzono alergię na białko mleka krowiego, nie należy stosować NAN® Expert Pro HA 2.

Informacje dodatkowe Nestle Nan Expertpro HA 2, mleko modyfikowane po 6 miesiącu, 800 g

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko początkowe, zasięgnij porady lekarza.

NAN® Expert Pro HA 2 stanowi tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia podczas i po okresie odstawienia od piersi.

Nie może zastępować mleka matki przez pierwsze 6. miesiące życia niemowlęcia.

Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Wprowadzanie do diety niemowlęcia innego mleka następnego lub mleka krowiego musi odbywać się pod kontrolą lekarza.

Przestrzegaj instrukcji przygotowywania. Niewłaściwe przygotowywanie, przechowywanie może stanowić zagrożenie dla życia dziecka.

Źle wygotowane butelki, nieprzegotowana woda lub nieprawidłowe przygotowanie mieszanki może zaszkodzić Twojemu dziecku.

Używaj wyłącznie załączonej do opakowania miarki. Użycie mniejszej lub większej ilości proszku niż wskazane może doprowadzić do niedożywienia niemowlęcia lub do odwodnienia organizmu. Nie zmieniaj proporcji proszku i wody porozumienia z lekarzem.

Każdorazowo sporządzaj tylko jedną porcję, którą podasz dziecku świeżo po przygotowaniu. Niezjedzone resztki pokarmu wylej.

Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.
Produkt przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
Zawartość opakowania zużyj w ciągu 3 tygodni od pierwszego otwarcia.

Dodatkowe informacje

Produkt pakowany w atmosferze chronionej.
Opakowanie 800 g starcza na przygotowania ok. 25 porcji mleka, zgodnie z tabelą karmienia.
Zawartość miarki = 4,56 g.