

Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 800 g



Cena: 84,99 zł

Opis słownikowy

Marka	NAN
Postać	proszek
Producent	Nestle
Rejestracja	Żywność
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 800 g

Nan Optipro 2, mleko następne, produkt spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla zdrowych niemowląt w drugim półroczu życia. Mleko następne **Nan Optipro 2** jest mlekiem następnym przeznaczonym dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, jako główny składnik diety podczas okresu odstawienia od piersi i po jego zakończeniu. Jest odpowiednie także do dokarmiania. **Nan Optipro 2** dostarcza Twojemu dziecku składniki pokarmowe niezbędne do optymalnego rozwoju. Oprócz innych składników, mleko zawiera także probiotyczne bakterie *Bifidobacterium lactis*, korzystnie wpływające na układ pokarmowy dziecka.

Skład Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 800 g

mleko odtuszczone, serwatka sódka (z mleka), laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej

s?onecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), permeat serwatkowy (z mleka), cytrynian wapnia, olej rybi, cytrynian potasu, emulgator (lecytyna sojowa), fosforan wapnia, chlorek magnezu, cytrynian sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K1, D3, biotyna, B12), chlorek sodu, siarczan ?elaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

Warto?? od?ywca	w 100 g proszku	w 100 ml gotowego mleka
Warto?? energetyczna	2089 kJ / 498 kcal	281 kJ / 67 kcal
T?uszcz, w tym:	23,6 g	3,2 g
kwasy t?uszczowe nasycone	5,7 g	0,8 g
kwasy t?uszczowe jednonienasycone	11,4 g	1,5 g
kwasy t?uszczowe wielonienasycone, w tym:	4,1 g	0,6 g
kwas linolowy	3500 mg	471 mg
kwas ?-linolenowy	300 mg	40,3 mg
DHA	125 mg	16,8 mg
W?glowodany, w tym:	61,9 g	8,3 g
cukry, w tym :	61,9 g	8,3 g
laktoza	61,9 g	8,3 g
Bia?ko	9,6 g	1,29 g
Witaminy:		
Witamina A	420 µg	56,46 µg
Witamina D	12,4 µg	1,67 µg
Witamina E	11 mg ?-tokoferol	1,48 mg ?-tokoferol
Witamina K	38 µg	5,1 µg
Witamina C	80 mg	10,75 mg
Tiamina (B1)	560 µg	75 µg
Ryboflawina (B2)	1100 µg	148 µg
Niacyna (B3)	4,2 mg	0,57 mg
Witamina B6	370 µg	50 µg

Foliany	150 µg-DFE	20,16 µg-DFE
Witamina B12	1,3 µg	0,18 µg
Biotyna (B7)	14 µg	1,88 µg
Kwas pantotenowy (B5)	4 mg	0,54 mg
Składniki mineralne:		
Sód	180 mg	24,2 mg
Potas	560 mg	75,28 mg
Chlorki	350 mg	47,05 mg
Wapń	540 mg	72,59 mg
Fosfor	300 mg	40,33 mg
Magnez	50 mg	6,72 mg
Żelazo	6 mg	0,81 mg
Cynk	3,7 mg	0,5 mg
Miedź	400 µg	54 µg
Mangan	180 µg	24,2 µg
Fluorki	<60 µg	<8,1 µg
Selen	25 µg	3,36 µg
Jod	100 µg	13,44 µg
Zawartość miarki: 4,48 g		

100 ml gotowego mleka = 3 porcje miarki proszku (13,44 g) + 90 ml wody

Dawkowanie Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca, 800 g

Uwaga! Podana poniżej wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.

W tym wieku zgodnie ze schematem żywienia niemowląt możesz zacząć rozszerzać dietę dziecka o posiłki inne niż mleko. Skonsultuj się z lekarzem przed wprowadzeniem nowych posiłków. Jeśli lekarz zaleci wcześniejsze podawanie innych posiłków, odpowiednio zmniejsz ilość podawanego mleka.

	7.-8. miesiąc życia	9.-12. miesiąc
--	----------------------------	-----------------------

ilość wody w porcji	180 ml	210 ml
liczba miarek* mleka w porcji	6	7
przeciętna liczba karmień dziennie	3	2-3

- *Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku nie wskazane może prowadzić do odwodnienia organizmu lub niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.
- Aby utrzymać odpowiednią liczbę kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C).

Sposób przygotowania mleka Nan Optipro:

Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko.

Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.

Doprowadź wodę pitną do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia.

Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.

Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku.

Zakręć butelkę i potrząśnij nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Zamknij dokładnie torebkę po każdym użyciu.

Informacje dodatkowe Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesięcy, 800 g

Nan Optipro 2, mleko następne w proszku przeznaczone jedynie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia stanowi tylko jeden z elementów zróżnicowanej diety niemowlęcia. Nie może być stosowane jako produkt zastępujący mleko kobiece w ciągu sześciu pierwszych miesięcy życia. Decyzję o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne konkretne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko początkowe, zasięgnij porady lekarza.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.

Nieprzetworzona woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie mleka może zaszkodzić Twojemu dziecku.

Zawsze przed przygotowaniem porcji mleka przegotuj wodę i wyparz butelkę.

Pamiętaj, aby przygotowywać mleko zgodnie z instrukcją na opakowaniu i każdorazowo przygotuj tylko jedną porcję mleka, którą od razu podasz dziecku.

Ostrzeżenie: Nieodpowiednie przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Nie przechowuj resztek mleka - niezjedzoną porcję mleka należy od razu wylać.

Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.

Galeria

