

Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 650 g



Cena: 90,59 zł

Opis słownikowy

Marka	NAN
Postać	proszek
Producent	Nestle
Rejestracja	Środki spożywcze
Substancja czynna	Multiminerale, Multiwitamina

Opis produktu

Informacje podstawowe Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 650 g

Nan Optipro 2, mleko następne, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla zdrowych niemowląt w drugim półroczu życia. Mleko następne Nan Optipro 2 jest mlekiem następnym przeznaczonym dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, jako płynny składnik diety podczas okresu odstawienia od piersi i po jego zakończeniu. Jest odpowiednie także do dokarmiania. Nan Optipro 2 dostarcza Twojemu dziecku składniki pokarmowe niezbędne do optymalnego rozwoju. Oprócz innych składników, mleko zawiera także probiotyczne bakterie Bifidobacterium lactis, korzystnie wpływające na układ pokarmowy dziecka.

Skład Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 650 g

Mleko odtuszczone, serwatka sódka (z mleka), laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), permeat serwatkowy (z mleka), cytrynian wapnia, olej rybi, cytrynian potasu, emulgator (lecytyna sojowa), fosforan wapnia, chlorek magnezu, cytrynian sodu, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy,

B1, B2, A, B6, kwas foliowy, K1, D3, biotyna, B12), chlorek sodu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

Wartość odżywcza	w 100 g proszku	w 100 g
Wartość energetyczna	2089 kJ / 498 kcal	281 kJ / 67 kcal
Tłuszcz, w tym:	23,6 g	3,2 g
kwasy tłuszczowe nasycone	5,7 g	0,8 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	11,4 g	1,5 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym:	4,1 g	0,6 g
kwas linolowy	3500 mg	471 mg
kwas α-linolenowy	300 mg	40,3 mg
DHA	125 mg	16,8 mg
Węglowodany, w tym:	61,9 g	8,3 g
cukry, w tym :	61,9 g	8,3 g
laktoza	61,9 g	8,3 g
Białko	9,6 g	1,29 g
Witaminy:		
Witamina A	420 µg	56,46 µg
Witamina D	12,4 µg	1,67 µg
Witamina E	11 mg α-tokoferol	1,48 mg
Witamina K	38 µg	5,1 µg
Witamina C	80 mg	10,75 mg
Tiamina (B1)	560 µg	75 µg
Ryboflawina (B2)	1100 µg	148 µg
Niacyna (B3)	4,2 mg	0,57 mg
Witamina B6	370 µg	50 µg
Foliany	150 µg-DFE	20,16 µg
Witamina B12	1,3 µg	0,18 µg
Biotyna (B7)	14 µg	1,88 µg
Kwas pantotenowy (B5)	4 mg	0,54 mg
Składniki mineralne:		

Sód	180 mg	24,2
Potas	560 mg	75,28
Chlorki	350 mg	47,05
Wap?	540 mg	72,59
Fosfor	300 mg	40,33
Magnez	50 mg	6,72
?elazo	6 mg	0,81
Cynk	3,7 mg	0,5 m
Mied?	400 µg	54 µg
Mangan	180 µg	24,2
Fluorki	<60 µg	<8,1
Selen	25 µg	3,36
Jod	100 µg	13,44
Zawarto?? miarki: 4,48 g		

100 ml gotowego mleka = 3 p?askie miarki proszku (13,44 g) + 90 ml wody

Wskazania Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 650 g

Mleko następne w proszku dla niemowląt po 6. miesiącu życia, podczas okresu odstawiania od piersi i po jego zakończeniu, do dokarmiania.

Dawkowanie Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 650 g

Uwaga! Podana poniżej wielko?? porcji jest ?redni?, jak? zjada dziecko w danym wieku zale?nie od indywidualnych potrzeb. Ró?nice mog? dotyczy? równie? liczby posi?ków. Zawsze konsultuj ilo?? posi?ków z lekarzem prowadz?cym.

W tym wieku zgodnie ze schematem ?ywienia niemowl?t mo?esz zacz?? rozszerza? diet? dziecka o posi?ki inne ni? mleko. Skonsultuj si? z lekarzem przed wprowadzeniem nowych posi?ków. Je?li lekarz zaleci wcze?niejsze podawanie innych posi?ków, odpowiednio zmniejsz ilo?? podawanego mleka.

	7.-8. miesi?c ?ycia	9.-12
--	---------------------	-------

ilość wody w porcji	180 ml	210 ml
liczba miarek* mleka w porcji	6	7
przeciętna liczba karmień dziennie	3	2-3

- *Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku nie wskazane może prowadzić do odwodnienia organizmu lub niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.
- Aby utrzymać odpowiednią liczbę żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C).

Sposób użycia

Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać mleko. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę tak, aby zostały usunięte wszelkie pozostałości mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia. Doprowadź wodę pitną do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia. Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki. Posługuj się wyłącznie załączoną miarką. Upewnij się, że załączona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej użyjesz. Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku. Zakręć butelkę i potrząśnij nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Zamknij dokładnie torebkę po każdym użyciu.

Przeciwwskazania Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 650 g

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Informacje dodatkowe Nestle NAN Optipro 2, mleko następne powyżej 6 miesiąca proszek, 650 g

Karmienie piersią jest najważniejszym sposobem żywienia niemowlęcia i powinno być kontynuowane tak długo, jak to jest możliwe. Mleko następne w proszku Nestle NAN OPTipro® 2 jest przeznaczone jedynie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia i powinno stanowić tylko jeden z elementów zróżnicowanej diety niemowlęcia.

Decyzję o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, w szczególności u dzieci poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć w porozumieniu z lekarzem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konkretnego niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju.

Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Mleko należy zawsze przygotowywać zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Niewłaściwe przygotowanie, sposób karmienia i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nieprzegotowana woda, niewygotowana butelka lub nieprawidłowo przygotowane mleko może zaszkodzić Twojemu dziecku.

Zawsze sporządzaj tylko jedną, świeżą porcję mleka, bezpośrednio przed karmieniem.

Nie przechowuj resztek porcji – niejedzone mleko wylej po skończonym karmieniu.

Zawsze przytrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.

Nie podgrzewaj mleka w kuchence mikrofalowej, ponieważ stwarza to ryzyko oparzenia.

Pamiętaj o właściwej higienie zębów dziecka.

Kiedy dziecko będzie odpowiednio duże, zamień butelkę na kubek.

Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury ok. 37°C, zbliżonej do temperatury ciała.

Po otwarciu zawartość opakowania nadaje się spożycia przez 3 tygodnie.

Opakowanie przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Dodatkowe informacje

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość miarki: 4,47 g.

Zawartość opakowania pozwala na przygotowanie około 24 porcji mleka o pojemności 200 ml, zgodnie z tabelą karmienia umieszczoną na opakowaniu.

Plastikowa miarka wykonana w min. 95% z trzciny cukrowej.