Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Nicorette Classic, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Cena: 83,49 zł

Opis słownikowy

Marka	Nicorette
Postać	guma do żucia
Producent	Johnson & Johnson
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Nikotyna

Opis produktu

Opis Nicorette Classic, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Teraz masz 2x większą szansę na rzucenie palenia z NTZ[2]

Prosty sposób na głód nikotynowy

Jak działają gumy

Poznaj Darka, który wygrał z paleniem ze wsparciem gum nicorette®

Jak działają gumy nicorette®?

Żuj gumę, kiedy masz ochotę na papierosa

Łagodzą objawy odstawienia papierosów t.j.: drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu*

Z czasem wystarczy Ci coraz mniejsza ilość gum, aby kontrolować głód nikotynowy

Stosuj przynajmniej 3 miesiące, a następnie zacznij proces zmniejszania dawek do całkowitego odstawienia

Jak żuć gumy nicorette®?

Żuj wolno aż poczujesz smak

Wtedy przerwij żucie i umieść gumę między dziąsłem a policzkiem

Kiedy smak zniknie żuj ponownie

Czynność powtarzaj przez 30 min

Wybierz odpowiednie gumy nicorette®

Wielkość dawki i czas trwania terapii

Krok 1	Krok 2

Palę dziennie 20 lub więcej papierosów

4 mg gumy	2 mg gumy
czas terapii: 6 tyg.	czas terapii: 12 tyg.

Palę dziennie mniej niż 20 papierosów

czas terapii: 6 tyg.

Wybierz swój wariant smakowy:

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rzucenie palenia?

Wybierz terapię łączoną

krok 1:

przyklej plaster

krok 2:

użyj dodatkowego produktu zawsze gdy poczujesz głód nikotynowy

Terapia łączona[3] to jednoczesne stosowanie dwóch produktów nicorette®, żeby łagodzić chęć zapalenia papierosa.

Sprawdź,
jak leczyć uzależnienie od wyrobów tytoniowych
z

Posłuchaj, co radzi certyfikowany
terapeuta uzależnień.

Rzuć palenie na dobre

z

Wybierz odpowiedni dla siebie produkt nicorette®:

Tabletki

Szybkie i dyskretne

Gumy

Proste i intuicyjne

Spray

Szybki w działaniu

Plastry

Wygodne i na cały dzień

*wg ChPL nicorette Classic Gum

1. W kategorii leków dostępnych bez recepty, OTC „preparaty stosowane w uzależnieniach – palenie papierosów" – dane PEX za okres YTD 10.2022.
2. 2 razy większa szansa na rzucenie palenia z Nikotynową Terapią Zastępczą vs placebo: A.h Maseeh, G. „A Review of Smoking Cessation Interventions" MedGenMed. 2005; 7(2):24.
3. Terapia Łączona to połączenie plastrów nicorette® INVISIPATCH oraz drugiego produktu nicorette® w formie doustnej (Aerozoli, Tabletek do ssania 2 mg lub Leczniczych gum do żucia 2 mg). Terapia Łączona przeznaczona jest dla osób silnie uzależnionych od palenia papierosów oraz mających trudności w opanowaniu chęci zapalenia papierosa lub które powróciły do nałogu pomimo stosowania monoterapii NTZ. Na podstawie ChPL nicorette® Invisipatch.

nicorette® CLASSIC GUM. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® CLASSIC GUM. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® FRESHFRUIT GUM. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów

odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® ICY WHITE GUM. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® FRESHMINT GUM. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® INVISIPATCH. Jeden system transdermalny, plaster 25 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 39,37 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® COOLMINT. Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i powyżej. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. w miarę możliwości nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® SPRAY. Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia bądź ograniczenia palenia przed całkowitym zaprzestaniem. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. w miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® COOLMINT. Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i powyżej. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. w miarę możliwości nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® INVISIPATCH. Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

PL-NI-2300170

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacje podstawowe Nicorette Classic, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Lecznica guma Nicorette wskazania jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu, poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego oraz objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

Skład Nicorette Classic, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Jedna kostka gumy Nicorette zawiera 4 mg nikotyny w postaci kompleksu żywicy nikotynowej 20%

substancje pomocnicze: bezwodny węglan sodu, guma bazowa, sorbitol proszek, aromat smakowy ZD-49284, aromat smakowy 83.6422, gliceryna 85%, zółcień chinolowa.

Działanie Nicorette Classic, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają się pojawiać różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za pomocą gumy Nicorette można im zapobiec lub je osłabić dostarczając do organizmowi w krótkim czasie niewielkie dawki nikotyny.

Wskazania Nicorette Classic, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Nicorette Classic Guma do żucia 4 mg to lek wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia.

Dawkowanie Nicorette Classic, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Wstępna dawka powinna zostać dobrana indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia od nikotyny.

Zazwyczaj stosuje się 8-12 gum o odpowiedniej zawartości nikotyny na dobę.

Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (Test Fagerstroma uzależnienia <6 lub palenie poniżej 20 papierosów na dobę) powinny rozpocząć leczenie od dawki 2 mg.

Osoby paląca o wysokim stopni uzależnienia powinny rozpocząć leczenie od dawki 4 mg.

Nie należy stosować więcej niż 24 gumy na dobę.

Przeciwwskazania Nicorette Classic, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Kiedy nie należy stosować gumy leczniczej Nicorette:

w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na składniki preparatu.

Informacje dodatkowe Nicorette Classic, 4 mg lecznicza guma do żucia, 105 szt

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nicorette Classic Gum należy omówić to z lekarzem w przypadku:
choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca,
przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego,
bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej,
choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
nadczynności tarczycy,
cukrzycy insulinozależnej,
stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy,
zapalenia przełyku,
niewyrównanego nadciśnienia tętniczego,
ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby,
ciężkiej choroby nerek.
Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach spowodować uszkodzenie protezy dentystycznej.
Lek zawiera 190,25 mg sorbitolu w każdej gumie do żucia, który jest źródłem fruktozy; w przypadku stwierdzenia wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancji niektórych cukrów lub stwierdzonej wcześniej u pacjenta dziedzicznej nietolerancji fruktozy, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie gumy Nicorette Classic Gum dłużej niż zalecany okres leczenia, lecz potencjalne ryzyko długotrwałego stosowania jest znacznie mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.
Lek Nicorette Classic Gum zawiera butylohydroksytoluen (E 321) i może powodować podrażnienie błon śluzowych.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę i uznaje się za „wolny od sodu".

Galeria