Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

No-Spa Max, 80 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Cena: 17,54 zł

Opis słownikowy

Marka	No-Spa
Postać	tabletki
Producent	Chinoin
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Drotaweryna

Opis produktu

Informacje podstawowe No-Spa Max, 80 mg tabletki powlekane, 20 szt.

No-Spa Max jest to lek rozkurczowy, który zmniejsza ból towarzyszący skurczom: narządów jamy brzusznej, przewodu pokarmowego (żołądka i jelit), dróg moczowych i żółciowych, a w przypadku kobiet także dróg rodnych.

Skład No-Spa Max, 80 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Substancj? czynn? leku jest drotaweryna.

Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg chlorowodorku drotaweryny (*Drotaverini hydrochloridum*).

Substancje pomocnicze: Rdze? tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian, talk. Otoczka tabletki: Opadry II yellow 85G32207: alkohol poliwinylowy, talk, ?ó?cie? chinolinowa lak (E 104), makrogol, tytanu dwutlenek (E 171), lecytyna (sojowa), ?elaza tlenek ?ó?ty (E 172), ?elaza tlenek czerwony

(E172).

Działanie No-Spa Max, 80 mg tabletki powlekane, 20 szt.

No-Spa Max zawiera jako substancję czynną chlorowodorek drotaweryny, która działa rozkurczowo na mięśnie gładkie. Lek stosuje się podczas skurczy pochodzenia nerwowego oraz mięśniowego. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe).

Wskazania No-Spa Max, 80 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Wskazaniami do stosowania No-Spa Max są:

skurcze mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamica dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie okołopęcherzykowe, zapalenie przewodów żółciowych, zapalenie brodawki Vatera;
skurcze mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz;

Wspomagająco lek stosuje się podczas:

skurczy mięśni gładkich przewodu pokarmowego: choroba wrzodowa żołądka oraz dwunastnicy, zapalenie żołądka, zapalenie jelit, trzustki, okrężnicy, stany skurczowe wpustu i odźwiernika żołądka, zespół drażliwego jelita grubego, wzdęcia jelit, zaparcia;
bolesne miesiączkowanie.

Dawkowanie No-Spa Max, 80 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty.

Zwykle zalecana dawka wynosi:

Dorośli: 1 tabletka powlekana 2 lub 3 razy na dobę. Dawka dobowa to 120 do 240 mg.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka powlekana 1 lub 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa dla dzieci wynosi 160 mg.
Bez konsultacji z lekarzem lek można stosować do 7 dni.

Przeciwwskazania No-Spa Max, 80 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Nie stosować leku No-Spa Max:

jeśli pacjent ma uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u pacjentów z ciężka niewydolnością wątroby, nerek i serca,
jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia,
u dzieci poniżej 12 lat.

Informacje dodatkowe No-Spa Max, 80 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niedociśnieniem oraz kobiet w ciąży.

No-Spa Max zawiera laktozę, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera żółcień chinolinową, co może powodować reakcje alergiczne.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie No-Spy Max z lewodopą może prowadzić do zmniejszonego działania przeciwparkinsonowego, objawiającego się nasileniem drżenia i sztywnością.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Drotaweryna przenika przez łożysko. Stosowanie w ciąży jest możliwe wyłącznie na zalecenie lekarza

Nie stosować leku w czasie porodu.

Stosownie drotaweryny w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W dawkach leczniczych No-Spa Max nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W przypadku pojawienia się zawrotów głowy należy unikać czynności typu: prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Galeria