

Olimp Gold-Vit C 2000 Shot, płyn w ampułkach o smaku cytrynowym, 25 ml



Cena: 5,99 zł

Opis słownikowy

Marka	Olimp
Postać	ampułki
Producent	Olimp Laboratories
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	Witamina C

Opis produktu

Informacje podstawowe Olimp Gold-Vit C 2000 Shot, płyn w ampułkach o smaku cytrynowym, 25 ml

Gold-vit C 2000 shot - suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych.

smak cytrynowy.

Skład Olimp Gold-Vit C 2000 Shot, płyn w ampułkach o smaku cytrynowym, 25 ml

stabilizator - maltitole: woda, cukier, 7% PureWay-C (kwas L-askorbinowy - witamina C, bioflawonoidy cytrusowe), naturalny aromat cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami, substancja konserwująca - kwas sorbowy: substancje słodzące - acesulfam K, sukraloza.

Składniki	25 ml	% RWS*
------------------	--------------	---------------

Witamina C	2000 mg	2500%
Bioflawonoidy cytrusowe	50 mg	---

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Zawiera cukier i substancje słodzące.

Działanie Olimp Gold-Vit C 2000 Shot, płyn w ampułkach o smaku cytrynowym, 25 ml

Witamina C wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się do utrzymania metabolizmu energetycznego oraz wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo witamina C wspomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i właściwe funkcjonowanie układu nerwowego oraz witamina C wspomaga produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, naczyń krwionośnych, chrząstek, kości, dziąseł i zębów.

Dawkowanie Olimp Gold-Vit C 2000 Shot, płyn w ampułkach o smaku cytrynowym, 25 ml

Dorośli: 1 ampułka (25 ml) dziennie po głównym posiłku.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Informacje dodatkowe Olimp Gold-Vit C 2000 Shot, płyn w ampułkach o smaku cytrynowym, 25 ml

Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Osoby z kamicą nerkową (szczawianową lub moczianową), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

Nie należy spożywać innych preparatów zawierających witaminę C.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

W przypadku objawów ze strony układu pokarmowego przerwać stosowanie.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w suchym pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej.

Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.