

## Panadol Femina, tabletki powlekane, 10 szt.

Cena: 18,49 zł



### Opis słownikowy

Marka	Panadol
Postać	tabletki
Producent	Glaxosmithkline
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Paracetamol

**Panadol 500+10 mg****10  
tab**

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Panadol Femina, tabletki powlekane, 10 szt.

Lek Panadol Femina o działaniu przeciwbólowym i rozkurczowym w bolesnym miesiączkowaniu.

## Skład Panadol Femina, tabletki powlekane, 10 szt.

Substancjami czynnymi leku s? paracetamol i hioscyny butylobromek.

1 tabletki zawiera: substancj? czynn?: paracetamol 500 mg, hioscyny butylobromek 10 mg,

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, powidon K30, sorbitol, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, makrogol 6000.

Lek zawiera sorbitol.

## Działanie Panadol Femina, tabletki powlekane, 10 szt.

Paracetamol stosowany jest do łagodzenia bólu i obniżania gorączki.

Butylobromek hioscyny znosi stany skurczowe w obrębie przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego.

## Wskazania Panadol Femina, tabletki powlekane, 10 szt.

Preparat stosowany w celu zapobiegania i leczenia dolegliwości związanych z:

bolesnym miesiączkowaniem,  
kolką nerkową lub wątrobową,  
zespołem drażliwego jelita.

## Dawkowanie Panadol Femina, tabletki powlekane, 10 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek, jeżeli jest to wskazane, maksymalnie 3 razy na dobę, co 8 godzin.

Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Paracetamolu nie należy stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci bez zalecenia lekarza.

## Przeciwwskazania Panadol Femina, tabletki powlekane, 10 szt.

Kiedy nie należy stosować leku Panadol Femina:

jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku,  
jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek,  
jeśli występuje choroba alkoholowa,  
jeśli występuje niedokrwistość oraz wrodzony brak dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (fawizm),  
jeśli występuje miastenia,  
jeśli występuje jaskra,  
jeśli występuje przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu,  
jeśli występuje przewężenia w przewodzie pokarmowym,  
jeśli występuje zaburzenia rytmu serca przebiegające z przyspieszeniem czynności serca.  
Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

## Informacje dodatkowe Panadol Femina, tabletki powlekane, 10 szt.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.  
Chronić od światła i wilgoci.  
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

## Galeria

