

Pangrol, 25 000 j. kapsułki, 20 szt.



Cena: 46,89 zł

Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Berlin Chemie
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Amylaza, Lipaza, Proteaza

Opis produktu

Informacje podstawowe Pangrol, 25 000 j. kapsułki, 20 szt.

Lek Pangrol 25 000 zawiera enzymy trawienne trzustki (enzymy trzustkowe).

Skład Pangrol, 25 000 j. kapsułki, 20 szt.

Substancja czynna:

Pankreatyna o aktywności:

Lipazy 25 000 j.Ph.Eur.

Amylazy 22 500 j. Ph.Eur.

Proteaz 1 250 j. Ph.Eur.

Substancje pomocnicze: kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, olej rycynowy, utwardzany, krzemu dwutlenek bezwodny koloidalny, magnezu stearynian, 30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1), typ C, trietylu cytrynian, 30% emulsja simeticonu, talk

kapsułka: żelatyna, żelaza tlenek czerwony E 172, żółcień chinolinowa E 104, żelaza tlenek żółty E 172, indygotyna E 132, tytanu dwutlenek E 171.

Wskazania Pangrol, 25 000 j. kapsułki, 20 szt.

Pangrol 25 000 zawiera enzymy trawienne trzustki (enzymy trzustkowe). Lek Pangrol 25 000 stosuje się jako uzupełnienie enzymów

trzustkowych u osób z zaburzeniami trawienia wynikającymi z barku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy. Takie zaburzenia mogą wystąpić w wyniku:

- przewlekłego zapalenia trzustki niezależnie od przyczyny,
- swoistej nieprawidłowej czynności trzustki,
- zwężenia przewodu trzustkowego spowodowanego n.p. przez chorobę nowotworową lub kamienie żółciowe,
- zaburzeń wątroby i dróg żółciowych, przebytej operacji trzustki lub wycięcia trzustki i dwunastnicy,
- przyspieszonego pasażu jelitowego po przebytej operacji żołądka i jelit, na skutek stresu lub chorób zapalnych jelit,
- spożywania ciężkostrawnych pokarmów roślinnych, tłuszczów lub pokarmów, do których układ trawienny nie jest przyzwyczajony,
- choroby trzewnej,
- chorób zapalnych jelit,
- cukrzycy,
- zespół nabytego braku odporności,
- zespół Shwachmana,
- zespół Sjogrena.

Lek można stosować u osób dorosłych i dzieci.

Dawkowanie Pangrol, 25 000 j. kapsułki, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie zależy od stopnia niedoboru enzymów trzustkowych, jak również od dostępności biologicznej leku. Może być konieczne przyjmowanie większych dawek. Zwiększenie dawkowania wymaga uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Nie należy przekraczać dobowej dawki 15 000 - 20 000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała.

O ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, należy przyjmować od 2 do 4 kapsułek leku Pangrol 10 000 na każdy posiłek.

Kapsułki leku Pangrol 10 000 należy połykać w całości w trakcie posiłku popijając dużą ilością wody.

Pacjenci, którzy nie są w stanie połknąć kapsułki, mogą wysypać jej zawartość do odpowiedniej ilości płynu i natychmiast zażyć bez rozgryzania lub żucia.

Przeciwwskazania Pangrol, 25 000 j. kapsułki, 20 szt.

Kiedy nie stosować leku Pangrol 25 000:

- u pacjentów z nadwrażliwością na wieprzowinę lub inny składnik leku Pangrol 25 000,
- u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki i ostrymi napadami w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby.

Informacje dodatkowe Pangrol, 25 000 j. kapsułki, 20 szt.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pojedynczych przypadkach, po przyjęciu enzymów trzustkowych, opisywano reakcje alergiczne typu natychmiastowego, takie jak: wysypka skórna, kichanie, łzawienie oczu, skurcz oskrzeli i reakcje alergiczne ze strony przewodu pokarmowego.

U pacjentów z charakterystycznymi zaburzeniami czynności trzustki (mukowiscydoza), w pojedynczych przypadkach po przyjęciu dużych dawek enzymów trzustkowych, opisywano występowanie zwężeń dolnych fragmentów jelita.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Pangrol 25 000 zawiera czynne enzymy, które w przypadku uwolnienia w jamie ustnej, na przykład po rozgryzieniu kapsułki, mogą prowadzić do uszkodzenia (owrzodzeń) błony śluzowej jamy ustnej. Dlatego należy zachować ostrożność i przyjmować lek wyłącznie w sposób zgodny z opisanym.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku z jedzeniem i pić

Kapsułki leku Pangrol 25 000 należy połykać w całości w trakcie posiłku popijając dużą ilością wody.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.