

Papilocare, żel dopochwowy, 5 ml x 7 aplikatorów



Cena: 95,89 zł

Opis słownikowy

Postać	żel
Producent	Gedeon Richter
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Beta-glukan, Wąkrota azjatycka

Opis produktu

Skład Papilocare, żel dopochwowy, 5 ml x 7 aplikatorów

Niosomy kwasu hialuronowego, niosomy β -glukanu, fitosomy wąkrotki azjatyckiej (Centella Asiatica), BioEcolia, Aloes (Aloe Vera), Wrośniak różnobarwny (Colorius versicolor), Wyciąg z miodły indyjskiej (Neem)

Działanie Papilocare, żel dopochwowy, 5 ml x 7 aplikatorów

Żel dopochwowy Papilocare, którego właściwości umożliwiają stworzenie warstwy ochronnej w strefie przekształceń nabłonkowych szyjki macicy w celu zapobiegania ryzyku integracji wirusa HPV. Przyspieszenie procesu gojenia, jeśli stosowany jest we wspomaganie leczenia zmian śródnabłonkowych wywołanych przez wirus. HPV w obrębie błony śluzowej szyjki macicy i pochwy.

Wskazania Papilocare, żel dopochwowy, 5 ml x 7 aplikatorów

Papilocare żel stosuje się w:

- Leczeniu zmian śródnabłonkowych wywołanych przez wirus HPV.
- Naprawie uszkodzeń błony śluzowej szyjki macicy i pochwy.

- Leczeniu suchości błony śluzowej pochwy.
- Przywróceniu równowagi mikrobiologicznej pochwy.
- Poprawie ogólnego stanu pochwy.
- Stworzeniu warunków do szybkiego gojenia się uszkodzeń na skutek drapania spowodowanego swędem i pieczeniem.

Dawkowanie Papilocare, żel dopochwowy, 5 ml x 7 aplikatorów

Aplikator Papilocare służy do jednorazowego użycia, jego zawartość należy stosować dopochwowo, najlepiej wieczorem przed snem. Ścisnąć opakowanie tak, aby opróżnić zawartość aplikatora i delikatnie wyjąć. Nie podmywać się. Wyrzucić jednorazowy aplikator. Zaleca się stosowanie raz dziennie przez 21 dni, a następnie co drugi dzień, w zależności od zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania Papilocare, żel dopochwowy, 5 ml x 7 aplikatorów

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.