

Paracetamol 2,4%, zawiesina doustna, (120 mg / 5 ml), 150 g



Cena: 12,89 pln

Opis słownikowy

Producent HASCO-LEK

Rejestracja

Opis produktu

Opis

Opis

Paracetamol 2,4%, zawiesina doustna

Skład

5 ml zawiesiny doustnej zawiera:

substancję czynną:

Paracetamol 120 mg

substancje pomocnicze: sacharoza, guma ksantan, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, sodu benzoosan, czerwień koszenilowa, aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Lek stosuje się doustnie.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przeciętna jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg na kilogram masy ciała lub według poniższej tabeli wiekowej. Pojedynczą dawkę można podawać 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.

Wiek dziecka	Średnia dawka na przeciętną masę ciała	Liczba łyżek miarowych zawiesiny
3 miesiące- 1 rok	80 mg	1/2 do 1 (2,5 do 5 ml)

2-3 lata	160 mg	1 do 1,5 (5 do 7,5 ml)
4-5 lat	240 mg	2 (10 ml)
6-8 lat	320 mg	2/5 do 3 (12,5 do 15 ml)
9-10 lat	400 mg	3 do 3,5 (15 do 17,5 ml)
11-12 lat	480 mg	4 (20 ml)

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku są stany gorączkowe i bóle różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu) oraz dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli występuje uczulenie na którykolwiek składnik leku, ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa. Nie stosować u niemowląt poniżej 3 miesiąca życia.

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi, leukocytów.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.