

Paracetamol Hasco Forte, zawiesina doustna dla niemowląt i dzieci o smaku truskawkowym, 85 ml



Cena: 18,89 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------|
| Postać | syrop |
| Producent | Hasco |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Paracetamol |

Opis produktu

Informacje podstawowe Paracetamol Hasco Forte, zawiesina doustna dla niemowląt i dzieci o smaku truskawkowym, 85 ml

Paracetamol Hasco Forte 240 mg/5 ml zawiesina doustna dla niemowląt i dzieci to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy o smaku truskawkowym.

Skład Paracetamol Hasco Forte, zawiesina doustna dla niemowląt i dzieci o smaku truskawkowym, 85 ml

Substancją czynną leku jest paracetamol. 5 ml zawiesiny zawiera 240 mg paracetamolu. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sodu benzoian (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat truskawkowy naturalny AR 2143 (zawiera naturalne substancje aromatyczne, w tym d-limonen oraz glikol propylenowy), woda oczyszczona.

Działanie Paracetamol Hasco Forte, zawiesina doustna dla niemowląt i dzieci o smaku truskawkowym, 85 ml

Paracetamol Hasco Forte 240 mg/5 ml zawiesina doustna dla niemowląt i dzieci jest lekiem, którego substancją czynną jest paracetamol. Zawiesina może być podawana do objawowego leczenia gorączki oraz bólu różnego pochodzenia. Może być stosowana w przypadku dolegliwości towarzyszących reakcji organizmu na szczepionkę.

Dawkowanie Paracetamol Hasco Forte, zawiesina doustna dla niemowląt i dzieci o smaku truskawkowym, 85 ml

O ile lekarz nie zaleci inaczej, przeciętna jednorazowa dawka paracetamolu wynosi 10 mg do 15 mg na kilogram masy ciała. W razie konieczności dawkę można powtarzać, nie częściej niż co 4-6 godzin, do 4 razy na dobę, czyli maksymalnie 60 mg/kilogram masy ciała/dobę.

Zwykle 10–15 mg/kg mc. lub w zależności od wieku:

- 0.–3. mż. (do 4 kg mc.) 60 mg
- 4.–8. mż. (do 7 kg mc.) 96 mg
- 9.–11. mż. (do 8 kg mc.) 120 mg
- 1–2 lat (do 10,5 kg mc.) 156 mg
- 2–3 lat (do 13 kg mc.) 192 mg
- 4–5 lat (do 18,5 kg mc.) 288 mg
- 6–8 lat (do 24 kg mc.) 360 mg
- 9–10 lat (do 32 kg mc.) 480 mg
- 11–12 lat (do 45,6 kg mc.) 684 mg