

## Pasta cynkowa z kwasem salicylowym, 20 g Avena



Cena: 4,19 zł

### Opis słownikowy

Marka	Avena
Postać	pasta
Producent	Farmina
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kwas salicylowy, Tlenek cynku, Wazelina

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Pasta cynkowa z kwasem salicylowym, 20 g Avena

Avena pasta cynkowa z kwasem salicylowym jest lekiem wysuszającym i przeciwbakteryjnym stosowanym pomocniczo w niewielkich wykwitach skórnych w przebiegu trądziku młodzieńczego.

### Skład Pasta cynkowa z kwasem salicylowym, 20 g Avena

Substancje czynne: acidum salicylicum (kwas salicylowy), zinci oxydum (tlenek cynku).

100 g pasty zawiera: acidum salicylicum (kwas salicylowy) 2,0 g, zinci oxydum (tlenek cynku) 25,0 g

Substancje pomocnicze: skrobia pszeniczna, wazelina biała

### Działanie Pasta cynkowa z kwasem salicylowym, 20 g Avena

Wysuszające, słabe przeciwbakteryjne.

### Wskazania Pasta cynkowa z kwasem salicylowym, 20 g Avena

Avena pasta cynkowa z kwasem salicylowym zaleca się stosować pomocniczo w niewielkich wykwitach skórnych w przebiegu trądziku młodzieńczego.

## Dawkowanie Pasta cynkowa z kwasem salicylowym, 20 g Avena

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Nakładać rękoma uprzednio dokładnie umyтыми 1-2 razy dziennie; stosować punktowo na zmienione powierzchnie skóry. Po zastosowaniu należy dokładnie umyć ręce.

## Przeciwwskazania Pasta cynkowa z kwasem salicylowym, 20 g Avena

Ostre stany zapalenie skóry. Nie stosować w obrębie skóry owłosionej oraz na rany i owrzodzenia.

## Informacje dodatkowe Pasta cynkowa z kwasem salicylowym, 20 g Avena

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Leku Avena pasta cynkowa z kwasem salicylowym nie należy stosować na rozległe powierzchnie skóry. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu z oczami. Osoby z astmą oskrzelową powinny przed zastosowaniem leku zasięgnąć opinii lekarza.

### Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje stosować.

### Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Zachować ostrożność u dzieci poniżej 12 lat; przed zastosowaniem u dzieci należy zasięgnąć opinii lekarza.

### Prowadzenie pojazdów i maszyn

Produkt nie wpływa na sprawność psychofizyczną.