


Piloxidil, 2% płyn na skórę głowy, 60 ml



Cena: 35,99 zł

Opis słownikowy

Postać	płyn
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Minoksydyl

Opis produktu

Informacje podstawowe Piloxidil, 2% płyn na skórę głowy, 60 ml

Piloxidil to produkt leczniczy stosowany na skórę w przypadku nadmiernego wypadania i w celu pobudzenia wzrostu włosów. Jest stosowany w łysieniu typu męskiego zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

Skład Piloxidil, 2% płyn na skórę głowy, 60 ml

Substancją czynną leku jest minoksydyl (Minoxidilum).

1ml leku zawiera 20mg minoksydylu.

Substancje pomocnicze: etanol, glikol propylenowy i woda oczyszczona.

Działanie Piloxidil, 2% płyn na skórę głowy, 60 ml

Piloxidil zawiera substancję czynną minoksydyl, pobudzającą wzrost włosów w łysieniu typu męskiego. Zatrzymanie nadmiernego wypadania włosów obserwuje się po około 8 tygodniach stosowania leku, natomiast pierwsze odrosty w postaci cienkich włosków męzkowych występują po upływie 4 do 5 miesięcy leczenia. Zaprzestanie leczenia powoduje cofanie się efektu leczniczego w ciągu kilku miesięcy.

Wskazania Piloxidil, 2% płyn na skórę głowy, 60 ml

Lek Piloxidil jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (alopecia androgenetica) u mężczyzn i u kobiet w wieku od 18 do 65 lat. Piloxidil jest najbardziej skuteczny u ludzi młodszych we wczesnych fazach procesu łysienia. Lepsze wyniki leczenia uzyskuje się w okolicy szczytu głowy niż w części czołowo-skroniowej.

Dawkowanie Piloxidil, 2% płyn na skórę głowy, 60 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Dorośli w wieku od 18 do 65 lat: Nanosić kroplami 1 ml leku (pięciokrotne naciśnięcie pompki) miejscowo na suchą skórę głowy 2 razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin, w miejscach wypadania włosów i lekko rozcierać opuszkami palców.

Miejsca aplikacji leku nie należy trzeć ani suszyć.

Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu leku.

Nie powinno się myć włosów i głowy przed upływem 4 godzin po zastosowaniu leku.

Należy zaprzestać leczenia po roku, jeżeli nie ma widocznych rezultatów kuracji.

Nie należy zwiększać dawek ani częstości stosowania leku. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania Piloxidil, 2% płyn na skórę głowy, 60 ml

Kiedy nie stosować leku Piloxidil:

jeżeli pacjent ma uczulenie na minoksydyl lub na którykolwiek składnik leku,
w chorobach skóry głowy, np. w nasilonych zmianach w łojotokowym zapaleniu skóry, w łuszczycy, w zakażeniach owłosionej skóry głowy, na skórę z objawami przerwania ciągłości naskórka,
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (leczonym i nieleczonym),
na poparzoną słońcem skórę głowy,
na świeżo ogoloną skórę głowy,
pod opatrunkiem okluzyjnym,
w razie stosowania miejscowo na owłosioną skórę głowy innych leków,
w okresie ciąży i karmienia piersią

Informacje dodatkowe Piloxidil, 2% płyn na skórę głowy, 60 ml

Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu leku.

Nie powinno się myć włosów i głowy przed upływem 4 godzin po zastosowaniu leku.

Nie należy stosować więcej niż 2 ml leku na dobę.

Nie należy stosować leku na inne części ciała.

W przypadku zatkania się rurki dozownika przez wykrystalizowany lek można ją przemyć ciepłą, przegotowaną wodą.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym z dala od źródeł ognia. Produkt jest łatwopalny.

Powinno się przerwać stosowanie produktu leczniczego Piloxidil oraz skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia i utrzymywania się jednego z takich objawów jak niedociśnienie tętnicze, obrzęki twarzy lub kostek u nóg i rąk, kołatanie serca lub przyspieszona czynność serca, szybki przyrost masy ciała, osłabienie i zawroty głowy lub omdlenia, zaburzenia ostrości widzenia, bóle w klatce piersiowej, barku lub ramieniu, utrzymujące się zaczerwienienie.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Piloxidil wchodzi w interakcje z:

z lekami stosowanymi miejscowo na skórę głowy, takimi jak np. kortykosteroidy, retynoidy, ditranol czy wazelina, gdyż mogą one zwiększać przenikanie minoksydylu przez skórę do krwi i spotęgować ryzyko działań niepożądanych; lekami obniżającymi ciśnienie krwi (np. guanetydyny). Przed użyciem leku Piloxidil należy zasięgnąć porady lekarza, ze względu na potencjalne ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować produktu leczniczego Piloxidil w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci, młodzieży poniżej 18 roku życia i u osób w podeszłym wieku.