

## Polopiryna Gardło, 8,75 mg pastylki twarde o smaku pomarańczowym, 16 szt.



Cena: 32,99 zł

### Opis słownikowy

Marka	Polopiryna
Postać	pastylki do ssania
Producent	Polpharma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Flurbiprofen

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Polopiryna Gardło, 8,75 mg pastylki twarde o smaku pomarańczowym, 16 szt.

Polopiryna Gardło zawiera flurbiprofen. Flurbiprofen należy do grupy leków określanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które mają właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne w leczeniu bólu gardła. Leki te działają poprzez zmianę odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę.

## Skład Polopiryna Gardło, 8,75 mg pastylki twarde o smaku pomarańczowym, 16 szt.

Każda pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Izomalt: 2034 mg/pastylkę; Maltitol: 427,5 mg/pastylkę; Czerwień koszenilowa (E 124): 0,013 mg/pastylkę; Żółcień pomarańczowa (E 110): 0,080 mg/pastylkę. Pastylka twarda. Okrągła, pomarańczowa pastylka twarda, o średnicy 19±1 mm, o smaku pomarańczowym.

## Wskazania Polopiryna Gardło, 8,75 mg pastylki twarde o smaku pomarańczowym, 16 szt.

Produkt leczniczy Polopiryna Gardło jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawowym bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

## Dawkowanie Polopiryna Gardło, 8,75 mg pastylki twarde o smaku pomarańczowym, 16 szt.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 pastylka twarda co 3 do 6 godzin, w razie potrzeby.  
Nie należy przyjmować więcej niż 5 pastylek w ciągu 24 godzin.

### Sposób podawania

Do stosowania w jamie ustnej.

Pastylkę należy powoli rozpuszczać w ustach, nie połykać i nie żuć pastylki.

Podczas rozpuszczania należy zawsze przemieszczać pastylkę w jamie ustnej.

## Przeciwwskazania Polopiryna Gardło, 8,75 mg pastylki twarde o smaku pomarańczowym, 16 szt.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; pacjenci z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); czynna lub nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia) i owrzodzenie jelit; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; ostatni trymestr ciąży; ciężka niewydolność serca, nerek lub wątroby.