

## Procto-Glyvenol, 50 mg + 20 mg/g krem doodbytniczy, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Cena: 38,69 zł

### Opis słownikowy

Postać	krem
Producent	Delfarma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Tribenozyd



### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Procto-Glyvenol, 50 mg + 20 mg/g krem doodbytniczy, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Lek Procto-Glyvenol w formie kremu doodbytniczego to preparat przeznaczony do leczenia zewnętrznych oraz wewnętrznych żylaków odbytu.

#### Skład Procto-Glyvenol, 50 mg + 20 mg/g krem doodbytniczy, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Substancjami czynnymi leku są: tribenozyd i lidokainy chlorowodorek. 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu + 20 mg lidokainy chlorowodorku. 100 g kremu zawiera 5 g tribenozydu + 2 g lidokainy chlorowodorku.

Inne składniki leku to: makrogolu eter cetostearylowy (cetomakrogol 1000), alkohol cetylowy, izopropylu palmitynian, parafina ciekła, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitanu stearynian (Arlacel 60), sorbitol ciekły, niekrystalizujący, kwas stearynowy, woda oczyszczona.

#### Działanie Procto-Glyvenol, 50 mg + 20 mg/g krem doodbytniczy, 30 g (import równoległy, Delfarma)

Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwozbrękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego.

Lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą i łagodzi dolegliwości spowodowane żylakami odbytu tj. świąd, pieczenie i ból.

Lek działa miejscowo, praktycznie nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

## **Wskazania Procto-Glyvenol, 50 mg + 20 mg/g krem doodbytniczy, 30 g (import równoległy, Delfarma)**

Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego jest lekiem przeznaczonym do leczenia zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu.

## **Dawkowanie Procto-Glyvenol, 50 mg + 20 mg/g krem doodbytniczy, 30 g (import równoległy, Delfarma)**

Krem doodbytniczy Procto-Glyvenol należy stosować rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem raz na dobę.

W przypadku leczenia wewnętrznych żylaków odbytu krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby. Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu a po aplikacji umieścić na swoim miejscu.

Lek Procto-Glyvenol należy stosować do ustąpienia objawów.

Jeżeli po 7 dniach stosowania leku nie ma poprawy, lub gdy pojawią się inne nieobserwowane wcześniej działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

## **Przeciwwskazania Procto-Glyvenol, 50 mg + 20 mg/g krem doodbytniczy, 30 g (import równoległy, Delfarma)**

Nie stosować leku Procto-Glyvenol jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tribenozyd, lidokainę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

## **Informacje dodatkowe Procto-Glyvenol, 50 mg + 20 mg/g krem doodbytniczy, 30 g (import równoległy, Delfarma)**

### Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

### Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Procto-Glyvenol u dzieci.