

Proyal 40 M, 2% żel dostawowy (40mg/2ml), 1 ampułko-strzykawką

Cena: 208,97 zł



Opis słownikowy

Postać	ampułko-strzykawką
Producent	Saspharma
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Kwas hialuronowy

Opis produktu

Informacje podstawowe Proyal 40 M, 2% żel dostawowy (40mg/2ml), 1 ampułko-strzykawką

PROYAL M jest nowoczesnym żelem hialuronowym, do stosowania dostawowego. PROYAL M składa się z kwasu hialuronowego o średniej masie cząsteczkowej – 1650kD po sterylizacji, pochodzenia fermentacyjnego. PROYAL M charakteryzuje się właściwościami lepkosprężystymi, co pozwala na normalizację lepkości płynu maziowego obecnego w jamie stawowej. PROYAL M działa tylko na staw, do którego jest wstrzykiwany, nie wywołując żadnych działań systemowych.

Skład Proyal 40 M, 2% żel dostawowy (40mg/2ml), 1 ampułko-strzykawką

Hialuronian sodu 20 mg/ml, chlorek sodu, diwodorofosforan sodowy dihydrat, disodu fosforan dodecahydrat, woda klasy WFI.

Działanie Proyal 40 M, 2% żel dostawowy (40mg/2ml), 1 ampułko-strzykawką

PROYAL M jest substytutem płynu synowialnego, który dzięki swoim właściwościom lepkosprężystym i smarnym sprzyja przywracaniu reologicznych właściwości stawów. Produkt, poprawiając właściwości płynu stawowego wykazując działanie ochronne, co w konsekwencji poprawia funkcjonalność stawu i zmniejsza dolegliwości bólowe.

Wskazania Proyal 40 M, 2% żel dostawowy (40mg/2ml), 1 ampułko-strzykawką

PROYAL M stosuje się w przypadku degeneracji chrząstki stawowej, chorobach zwyrodnieniowych stawów oraz pourazowych zmianach

w stawach maziowych, takich jak: zwyrodnienie stawu kolanowego, kontuzji kolan (tzw. kolano biegacza).

Dawkowanie Proyal 40 M, 2% żel dostawowy (40mg/2ml), 1 ampułko-strzykawka

Sposób dawkowania ustala lekarz. Standardowo PROYAL M podaje się w odstępach tygodniowych. W sumie wykonuje się od 1 do 4 zastrzyków dostawowych.

Informacje dodatkowe Proyal 40 M, 2% żel dostawowy (40mg/2ml), 1 ampułko-strzykawka

Proyal M jest produktem medycznym jednorazowego użytku, dlatego należy go używać tylko raz na jednym pacjencie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.