

Pyrantelum OWIX, 250 mg tabletki, 3 szt.

Cena: 17,31 zł



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Polpharma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Pyrantel

Opis produktu

Informacje podstawowe Pyrantelum OWIX, 250 mg tabletki, 3 szt.

Pyrantelum OWIX jest produktem leczniczym o działaniu przeciwpasożytniczym. Lek stosuje się w zakażeniu owsikami u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

Skład Pyrantelum OWIX, 250 mg tabletki, 3 szt.

Substancj? czynn? leku jest pyrantel (*Pyrantelum*).

1 tabletko zawiera 250 mg pyrantelu.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, magnezu stearynian, aromat pomara?czowy.

Działanie Pyrantelum OWIX, 250 mg tabletki, 3 szt.

Pyrantelum OWIX oddzia?uje na robaki ob?e zlokalizowane w obr?bie przewodu pokarmowego. Pora?a ich mi??nie, dzi?ki czemu zostaj? one usuni?te za pomoc? ruchów perystaltycznych jelit. Lek nie dzia?a na larwy w trakcie ich migracji przez tkanki.

Pyrantelum OWIX dzia?a na nast?puj?ce robaki ob?e:

- *Enterobius vermicularis*,
- *Ascaris lumbricoides*,
- *Ancylostoma doudenale*,
- *Necator americanus*,
- *Trichostrongylus orientalis*,
- *Trichostrongylus colubriformis*.

Wskazania Pyrantelum OWIX, 250 mg tabletki, 3 szt.

Owsica u dzieci w wieku od 6 lat i doros?ych, wywo?ana przez *Enterobius vermicularis*.

Dawkowanie Pyrantelum OWIX, 250 mg tabletki, 3 szt.

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

- Lek stosuje si? doustnie.
- Tabletk? **Pyrantelum OWIX** nale?y dok?adnie rozgry?? lub rozkruszy? przed po?kni?ciem.
- Lek popi? wod?. Przyj?? w trakcie lub po posi?ku.
- Po dwóch lub trzech tygodniach od przyj?cia pierwszej dawki, nale?y przyj?? kolejn? dawk?.
- Po up?ywie 14 dni od zako?czenia leczenia nale?y wykona? kontrolne badania parazytologiczne.

Doro?li i dzieci powy?ej 6 roku ?ycia:

Masa cia?a	Dawka jednorazowa	Dawka jednorazowa
------------	-------------------	-------------------

		(mg)
17-28 kg	1 tabletki	250 mg
29-39 kg	1½ tabletki	375 mg
40-50 kg	2 tabletki	500 mg
51-62 kg	2½ tabletki	625 mg
63-75 kg	3 tabletki	750 mg
Dorośli o masie ciała >75 kg	4 tabletki	1000 mg

Przeciwwskazania Pyrantelum OWIX, 250 mg tabletki, 3 szt.

Kiedy nie stosować leku Pyrantelum OWIX:

jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent przyjmuje piperazynę,
jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).

Informacje dodatkowe Pyrantelum OWIX, 250 mg tabletki, 3 szt.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia,
ból głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność,
wysypka,
osłabienie,
przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością:

parcie na stolec,
omamy z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia),
gorączka,
zaburzenia słuchu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku zaburzeń czynności wątroby, niedożywienia lub anemii należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie:

Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Pyrantelum OWIX może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu (stosowana w leczeniu astmy).

Leku nie można stosować łącznie z piperazyną – działanie obu leków ulega osłabieniu.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia ze względu na postać leku (tabletki).