


## Raphacholin forte, 250 mg tabletki powlekane, 30 szt.

Cena: 33,83 zł



### Opis słownikowy

Marka	Raphacholin
Postać	tabletki
Producent	Herbapol Wrocław
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kwas dehydrocholowy

### Opis produktu

#### Informacje podstawowe Raphacholin forte, 250 mg tabletki powlekane, 30 szt.

Raphacholin Forte to lek w postaci tabletek powlekanych do stosowania w niedostatecznym wydzielaniu żółci przez wątrobę i niestrawności objawiającej się wzdęciami, bólami brzucha, odbijaniem, nudnościami, zaparciami oraz jako łagodny środek przeczyszczający.

#### Skład Raphacholin forte, 250 mg tabletki powlekane, 30 szt.

Substancj? czynn? leku jest kwas dehydrocholowy (*Acidum dehydrocholicum*).

1 tabletko powlekana zawiera 250 mg kwasu dehydrocholowego (*Acidum dehydrocholicum*).

Substancje pomocnicze: Wyci?g suchy z korzenia rzodkwi czarnej (10-15:1) [wyci?g natywny (20-30:1) 50 % , maltodekstryna 50 % , ekstrahent – woda] Olejek eteryczny mi?towy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetyloskrobi, skrobia

ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sodu laurylosiarczan, w?giel aktywny, pow?oczka Aqua Polish black 081.06 o sk?adzie: hypromeloza, laktoza jednowodna, talk, makrogol, tlenek ?elaza czarny (E 172), indygotyna (E 132).

### **Działanie Raphacholin forte, 250 mg tabletki powlekane, 30 szt.**

Raphacholin Forte zwiększa objętość wydzielanej żółci (żółciopędny) oraz przyspiesza jej transport do dwunastnicy. Zwiększona ilość żółci pobudza pracę jelita grubego, dzięki czemu produkt posiada łagodne działanie przeczyszczające.

### **Wskazania Raphacholin forte, 250 mg tabletki powlekane, 30 szt.**

Rapacholin forte tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), w niedostatecznym wydzielaniu żółci przez wątrobę.

### **Dawkowanie Raphacholin forte, 250 mg tabletki powlekane, 30 szt.**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **Przeciwwskazania Raphacholin forte, 250 mg tabletki powlekane, 30 szt.**

Nie należy stosować leku nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie należy stosować w ostrych i przewlekłych schorzeniach wątroby, ostrych stanach zapalnych w obrębie przewodu pokarmowego, niedrożności dróg żółciowych i przewodu pokarmowego.

### **Informacje dodatkowe Raphacholin forte, 250 mg tabletki powlekane, 30 szt.**

#### **Działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana: nudności, wymioty, biegunka, inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, reakcje alergiczne.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

W przypadku kamicy żółciowej lub przewodowej stosowanie leku wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Nie stosować leku dłużej niż tydzień w przypadku zaparć.

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Lek zawiera jako substancję pomocniczą olejek eteryczny miętowy, który może wywoływać reakcje alergiczne.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

#### **Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

#### **Stosowanie leku z jedzeniem i piciem**

W przypadku niestrawności, lek stosuje się po posiłku.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży**

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.