

Ruskolina Plus, kapsułki twarde, 30 szt.



Cena: 12,68 zł

Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Aurovitas Pharma
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	Kasztanowiec, Ruskogenina, Ruszczyk

Opis produktu

Informacje podstawowe Ruskolina Plus, kapsułki twarde, 30 szt.

Ruskolina Plus - suplement diety zawierający zestaw składników wspomagający prawidłowe działanie naczyń krwionośnych. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Ruskolina Plus, kapsułki twarde, 30 szt.

Ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego (*Ruscus aculeatus* L.) standaryzowany na 5% zawarto?? ruskogeniny; metylochalkon hesperydyny; ekstrakt z nasion kasztanowca (*Aesculus hippocastanum* L.) standaryzowany na 40% zawarto?? escyny; witamina C (kwas L-askorbinowy); ?elatyna; substancja wype?niaj?ca: celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek krzemu; dwutlenek tytanu; barwnik: tlenki i wodorotlenki ?elaza, azorubina.

Sk?adniki	1 kapsu?ka	% RWS*
Ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego	150 mg	---

w tym:	7,5 mg	---
ruskogenina		
Metylochalkon hesperydyny	150 mg	---
Ekstrakt z nasion kasztanowca	125 mg	---
w tym:	50 mg	---
escyna		
Witamina C	100 mg	125%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Działanie Ruskolina Plus, kapsułki twarde, 30 szt.

Ekstrakt z ruszczyka kolczastego wspomaga krążenie żyłne, wspiera funkcjonowanie naczyń krwionośnych w nogach, wspomaga zmniejszyć obrzęk.

Kwas L-askorbinowy wspomaga w prawidłowej produkcji kolagenu.

Ekstrakt z nasion kasztanowca wspomaga w utrzymaniu prawidłowego krążenia krwi oraz wspomaga zdrowie układu krążenia, dodatkowo wspomaga utrzymać odpowiednie krążenie żyłne w nogach i wpływa na zmniejszenie uczucia ciężkich nóg.

Dawkowanie Ruskolina Plus, kapsułki twarde, 30 szt.

Dorośli: 1 kapsułka dziennie, podczas posiłku, popijając wodą.

Informacje dodatkowe Ruskolina Plus, kapsułki twarde, 30 szt.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu.

Nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Osoby z niskim ciśnieniem tętniczym krwi oraz ze skłonnością do krwawień powinny zachować ostrożność.

Należy przerwać stosowanie suplementu diety na dwa tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Jeśli w czasie stosowania preparatu wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, należy przerwać jego stosowanie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

MEDEST

BO TWOJE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48