

Scopolan, 10 mg czopki doodbytnicze, 6 szt.

Cena: 16,09 zł



Opis słownikowy

Marka	Scopolan
Postać	czopki
Producent	Herbapol Wrocław
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Hioscyna

Opis produktu

Informacje podstawowe Scopolan, 10 mg czopki doodbytnicze, 6 szt.

Scopolan to produkt leczniczy stosowanym w dolegliwościach skurczowych mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej, układu moczowo-płciowego oraz dróg żółciowych.

Skład Scopolan, 10 mg czopki doodbytnicze, 6 szt.

Substancj? czynn? jest: butlobromek hioscyny.

1 czopek zawiera 10 mg butylobromku hioscyny (*Hyoscini butylbromidum*).

Substancje pomocnicze: t?uszcz sta?y, polisorbant 80, parafina ciek?a, woda oczyszczona.

Działanie Scopolan, 10 mg czopki doodbytnicze, 6 szt.

Scopolan działa spazmolitycznie na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego.

Wskazania Scopolan, 10 mg czopki doodbytnicze, 6 szt.

stany skurczowe w obrębie przewodu pokarmowego (skurcz żołądka, kolka jelitowa, Zespół Jelita Drażliwego),
stany skurczowe dróg żółciowych (kolka żółciowa),
stany skurczowe układu moczowo-płciowego (bolesne miesiączkowanie, kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicią moczowodową).

Dawkowanie Scopolan, 10 mg czopki doodbytnicze, 6 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować wyłącznie doraźnie (w przypadku wystąpienia dolegliwości).

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doodbytniczo 1 do 2 czopków 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: doodbytniczo 1 czopek 2 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania Scopolan, 10 mg czopki doodbytnicze, 6 szt.

Kiedy nie stosować leku Scopolan:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze leku,
w przypadku uczulenia na alkaloidy tropanowe (atropina i jej pochodne),
jeśli pacjent choruje na: jaskrę z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenną jelit, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, tachykardię, nużliwość mięśni,

Informacje dodatkowe Scopolan, 10 mg czopki doodbytnicze, 6 szt.

W przypadku bólu brzucha (nagłego i o nieznanym przyczynie) i jednoczesnym występowaniu: gorączki, nudności, wymiotów, zmiany rytmu wypróżnień, tkliwość brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia, obecność krwi w kale - nie powinno stosować się leku bez konsultacji z lekarzem.

Należy zachować ostrożność stosując lek w następujących schorzeniach: choroba refluksowa przełyku, wrzodziejące zapalenie jelit, choroby niedokrwiennej serca.

Należy ostrożnie dawkować lek w przypadku osób starszych.

Należy przerwać leczenie Scopolanem w przypadku wzrostu ciśnienia śródgałkowego lub zaburzonej ostrości widzenia.

Lek zmniejsza wydzielanie potu.