

Scopolan, 10 mg tabletki drażowane, 30 szt.

Cena: 28,29 zł



Opis słownikowy

Marka	Scopolan
Postać	tabletki
Producent	Herbapol Wrocław
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Hioscyna

Opis produktu

Informacje podstawowe Scopolan, 10 mg tabletki drażowane, 30 szt.

Scopolan to produkt leczniczy stosowany w dolegliwościach skurczowych przewodu pokarmowego (skurcz żołądka, kolka jelitowa, kolka żółciowa, kolka nerkowa).

Skład Scopolan, 10 mg tabletki drażowane, 30 szt.

Substancj? czynn? jest: butylobromek hioscyny.

1 tabletk? drażowana zawiera 10 mg hioscyny butylobromku (*Hyoscini butylbromidum*).

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, guma arabska, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

Działanie Scopolan, 10 mg tabletki drażowane, 30 szt.

Scopolan wykazuje działanie spazmolityczne na mięśniówkę gładką przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-

płciowego.

Wskazania Scopolan, 10 mg tabletki drażowane, 30 szt.

dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (skurcz żołądka, kolka jelitowa, Zespół Jelita Drażliwego), dróg żółciowych (kolka żółciowa),
dolegliwości bólowe układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową).

Dawkowanie Scopolan, 10 mg tabletki drażowane, 30 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego i doraźnego.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych 3 do 5 razy na dobę.

Dzieci od 6 do 12 lat: doustnie 1 tabletkę drażowaną 2 razy na dobę.

Przeciwwskazania Scopolan, 10 mg tabletki drażowane, 30 szt.

Kiedy nie stosować leku Scopolan:

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych,
w przypadku uczulenia na alkaloidy tropanowe (np. atropina) i ich pochodne,
jeśli pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenną jelit, zwężenie przetyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardię, nużliwość mięśni,
patologiczne poszerzenie jelita grubego,
nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Informacje dodatkowe Scopolan, 10 mg tabletki drażowane, 30 szt.

Scopolan zawiera laktozę jednowodną i sacharozę - nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nietolerancją cukrów (nietolerancja fruktozy, galaktozy, brak laktazy).

Nie stosować w przypadku bólu brzucha o nieznanym przyczynie z towarzyszącą gorączką, nudnościami, wymiotami, zmianami rytmu wypróżnień, tkliwością brzucha, zmniejszeniem ciśnienia krwi, omdleniami, obecnością krwi w stolcu.

Należy stosować ostrożnie w przypadku: choroby refluksowej przetyku, wrzodziejącego zapalenia jelit, choroby niedokrwiennej serca.

Należy przerwać stosowanie produktu w przypadku wzrostu ciśnienia gałkowego lub zaburzeń ostrości widzenia.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.