

Scorbolamid EXTRA Hot, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 8 saszetek DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Cena: 9,89 zł



Opis słownikowy

Marka	Scorbolamid
Postać	saszetki
Producent	Polpharma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Cynk, Rutozyd, Salicylamid, Witamina C

Opis produktu

Informacje podstawowe Scorbolamid EXTRA Hot, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 8 saszetek DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Lek Scorbolamid EXTRA Hot o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, a także wspomagający odporność.

Skład Scorbolamid EXTRA Hot, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 8 saszetek DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Substancjami czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowy, rutozyd i cynk. Każda saszetka zawiera 300 mg salicylamidu, 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu oraz 5 mg cynku w postaci glukonianu cynku.

Pozostałe składniki to: mannitol SD100, mannitol M100, hydroksypropyloceluloza, kwas cytrynowy bezwodny, aromat cytrynowy, sukraloza, krzemionka koloidalna bezwodna.

Działanie Scorbolamid EXTRA Hot, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 8 saszetek DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Lek Scorbolamid EXTRA Hot zawiera:

Salicylamid - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Rutozyd – pobudza układ odpornościowy i wspiera organizm w walce z infekcją wirusową. Zwiększa wchłanianie witaminy C, a także przedłuża jej działanie.

Kwas askorbowy (witamina C) - uzupełnia niedobór witaminy C, wspomaga organizm przy infekcjach wirusowych i bakteryjnych.

Wpływa na procesy związane z odpornością.

Cynk – uzupełnia niedobór cynku, wspomaga odporność organizmu.

Wskazania Scorbolamid EXTRA Hot, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 8 saszetek DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Gorączka i objawy związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, wspomaganie odporności organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk oraz uszczelnianie naczyń włosowatych.

Dawkowanie Scorbolamid EXTRA Hot, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 8 saszetek DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzie w wieku powyżej 16 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę. Wysypa zawartość jednej saszetki leku Scorbolamid EXTRA Hot do pół szklanki ciepłej wody i dokładnie zamieszać. Wypić natychmiast zawiesinę powstałą po rozpuszczeniu granulatu. Uwaga: granulat nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu. Lek przyjmować po posiłku.

Jeśli objawy nie ustąpią po 3-5 dniach leczenia lub nasilą się (nawet przed upływem tego czasu) należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Scorbolamid EXTRA Hot, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 8 saszetek DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Kiedy nie stosować leku Scorbolamid EXTRA Hot:

jeśli pacjent ma uczulenie na salicylamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

jeśli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne;

jeśli pacjent ma astmę z polipami nosa;

jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) stany zapalne przewodu pokarmowego;

jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);

jeśli pacjent ma zaburzenia krzepności krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);

jeśli pacjent ma genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej;

jeśli pacjent ma kamice nerkową;
jeśli pacjent ma hemochromatozę (cukrzyca brązowa), niedokrwistość syderoblastyczną, nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
jeśli pacjentka jest w ciąży;
jeśli pacjentka karmi piersią;
jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;
u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, (poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki), ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye'a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Informacje dodatkowe Scorbolamid EXTRA Hot, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 8 saszetek DATA WAŻNOŚCI 31.05.2024r.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może wywołać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane związane z przyjmowaniem salicylamidu. Najczęstsze działania niepożądane występują ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego. Mogą wystąpić: nudności, wymioty, skurcze w obrębie jamy brzusznej, uczucie palenia za mostkiem, brak łaknienia, biegunka, podrażnienie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy (nadżerki i owrzodzenia), suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, senność, bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, wysypka, nadmierna potliwość.

Leku nie należy stosować u pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne wywoływały wysypkę, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa lub wstrząs, gdyż istnieje możliwość wystąpienia tych działań niepożądanych po zastosowaniu leku Scorbolamid EXTRA Hot.

Działania niepożądane związane z przyjmowaniem kwasu askorbowego: kwas askorbowy zmniejsza pH moczu, co ułatwia wytrącanie się moczanów, cystyny lub szczawianów; kwas askorbowy może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną).

Działania niepożądane związane z przyjmowaniem cynku: nudności, wymioty, biegunka; bóle głowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, a szczególnie o:

lekach zawierających kwas acetylosalicylowy, lekach z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, diklofenak);
kortykosteroidach ponieważ salicylamid może nasilać objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego;
doustnych lekach przeciwcukrzycowych, lekach przeciwzakrzepowych, kwasie walproinowym, sulfonamidach;
metotreksacie w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień;

Lek należy przyjmować co najmniej dwie godziny po zastosowaniu wymienionych związków;

chemioterapeutykach przeciwbakteryjnych z grupy chinolonów, w tym fluorochinolonów, ponieważ cynku może zmniejszać wchłanianie tych produktów;

kwasie foliowym, związkach wapnia i żelaza, które mogą zmniejszać wchłanianie cynku;

penicylinach i innych substancjach chelatujących.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

MEDEST

BO TWOJE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48