

Scorbolamid Extra, tabletki powlekane, 20 szt.

Cena: 19,79 zł



Opis słownikowy

Marka	Scorbolamid
Postać	tabletki
Producent	Polpharma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Salicylamid, Witamina C

Opis produktu

Informacje podstawowe Scorbolamid Extra, tabletki powlekane, 20 szt.

Scorbolamid EXTRA to lek, który zarówno zwalcza objawy przeziębienia i grypy, gorączkę, bóle głowy, jak również wspomaga organizm przy infekcjach wirusowych i bakteryjnych oraz pomaga w utrzymaniu odporności organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk.

Skład Scorbolamid Extra, tabletki powlekane, 20 szt.

Substancjami czynnymi leku s? salicylamid (*Salicylamidum*), kwas askorbowy (*Acidum ascorbicum*), rutozyd (*Rutosidum*) i cynk (*Zincum*).

1 tabletkę zawiera 300 mg salicylamidu, 200 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu oraz 5 mg cynku w postaci glukonianu cynku.

Substancje pomocnicze: Rdze? tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon typ B, hydroksypropyloceluloza, talk.

Otoczka tabletki I – Opadry White YS-1-7027: hypromeloza 2910 (6cP), triacetyna,

tytanu dwutlenek (E 171);

Otoczka tabletki II – sukraloza, Opadry Orange 85G33255: alkohol poliwinylowy (E 1203), talk, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), ?ó?cie? pomara?czowa FCF (E 110), tartrazyna (E 102), lecytyna sojowa (E 322).

Działanie Scorbolamid Extra, tabletki powlekane, 20 szt.

Salicylamid działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie;

Rutozyd pobudza układ odpornościowy i wspiera organizm w walce z infekcją wirusową. Zwiększa wchłanianie witaminy C, a także przedłuża jej działanie;

Kwas askorbowy (witamina C) uzupełnia niedobór witaminy C, wspomaga organizm przy infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Wpływa na procesy związane z odpornością;

Cynk uzupełnia niedobór cynku, wspomaga odporność organizmu.

Wskazania Scorbolamid Extra, tabletki powlekane, 20 szt.

Gorączka i objawy związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, wspomaganie odporności organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk oraz uszczelnianie naczyń włosowatych.

Dawkowanie Scorbolamid Extra, tabletki powlekane, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: 1 tabletkę 3 razy na dobę

Doustnie

Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, popijając szklanką wody.

Jeżeli objawy nie ustąpią po 3-5 dniach leczenia lub nasiliły się (nawet przed upływem tego czasu) należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Lek stosuje się tylko krótkotrwale w możliwie najniższych dawkach.

Przeciwwskazania Scorbolamid Extra, tabletki powlekane, 20 szt.

Kiedy nie stosować leku Scorbolamid EXTRA:

jeśli pacjent ma uczulenie na salicylamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

jeśli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne;

jeśli pacjent ma astmę z polipami nosa;

pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) stany zapalne przewodu pokarmowego;

jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);

jeśli pacjent ma zaburzenia krzepności krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);

jeśli pacjent ma genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej;

jeśli pacjent ma kamicę nerkową;

jeśli pacjent ma hemochromatozę (cukrzyca brązowa), niedokrwistość syderoblastyczną, nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;

jeśli pacjentka jest w ciąży;

jeśli pacjentka karmi piersią;

jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, (poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki), ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye'a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Informacje dodatkowe Scorbolamid Extra, tabletki powlekane, 20 szt.

Lek Scorbolamid EXTRA zawiera tartrazynę (E 102) oraz żółcień pomarańczową FCF (E 110), dlatego lek może powodować reakcje alergiczne.

Jeżeli u pacjenta występuje któryś z następujących dolegliwości skonsultować się z lekarzem: astmę oskrzelową; jeśli pacjent ma niewydolność wątroby lub nerek; u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej i krwawieniach z przewodu pokarmowego; jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.