


Simetic Fortis, 80 mg kapsułki miękkie, 60 szt.

Cena: 8,50 zł



Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Fortis
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Simetikon

Opis produktu

Informacje podstawowe Simetic Fortis, 80 mg kapsułki miękkie, 60 szt.

Simetic Fortis 80 mg to wyrób medyczny leczniczy w postaci miękkich kapsułek zawierających 80 mg symetykonu. Przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia uczucia pewności, uczucia wzdęcia, odbijania oraz dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów lub powietrza w przewodzie pokarmowym, które to powodują uczucie ucisku i napięcia w jelitach. Może być także stosowany pomocniczo przed badaniami diagnostycznymi takimi jak ultrasonografia, kolonoskopia, endoskopia lub radiografia, aby usunąć z przewodu pokarmowego pęcherzyki gazów. Ma to na celu poprawę jakości uzyskanego obrazu.

Skład Simetic Fortis, 80 mg kapsułki miękkie, 60 szt.

Składnikami otoczek: żelatyna wieprzowa, glicerol.

1 kapsułka zawiera:

80 mg symetykonu.

Działanie Simetic Fortis, 80 mg kapsułki miękkie, 60 szt.

Składnik aktywny, czyli symetykon zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazów w jelitach, co ułatwia ich pękanie i usuwanie. Działa na zasadzie fizycznego mechanizmu. Nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego, dzięki czemu wydalany jest w postaci niezmienionej.

Wskazania Simetic Fortis, 80 mg kapsułki miękkie, 60 szt.

Łagodzenie uczucia pełności, wzdęć lub odbijania oraz innych dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów. Pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej. Wyrób medyczny przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci powyżej 6 roku życia. Simetic Fortis 80 mg mogą stosować osoby chore na cukrzycę oraz z zaburzeniami trawienia cukrów.

Dawkowanie Simetic Fortis, 80 mg kapsułki miękkie, 60 szt.

Jak stosować Simetic Fortis 80 mg?

Simetic Fortis 80 mg stosuje się doustnie przed lub po posiłku.

Kapsułkę należy popić odpowiednią ilością płynu (1 szklanka).

Osoby chore na cukrzycę nie wymagają zmiany dawkowania.

Łagodzenie objawów związanych z uciskiem i napięciem w jelitach

Dorośli: doraźnie 1-2 kapsułki 3-4 razy dziennie. Maksymalnie 8 kapsułek dziennie, czyli 640 mg symetykonu.

Dzieci od 6 do 18 roku życia: doraźnie 1 kapsułka 3 razy dziennie. Maksymalnie 3 kapsułki dziennie, czyli 240 mg symetykonu.

Kobiety w ciąży: według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Przygotowanie do badań diagnostycznych

Dorośli: dzień przed planowanym badaniem jamy brzusznej - 1 kapsułka 3 razy dziennie. W dniu badania - 2 kapsułki rano na czczo.

Dzieci od 6 do 18 roku życia: dzień przed planowanym badaniem diagnostycznym - 1 kapsułka 3 razy dziennie. W dniu badania - 2 kapsułki rano na czczo.

Kobiety w ciąży: według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania Simetic Fortis, 80 mg kapsułki miękkie, 60 szt.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Nie stosować w przypadku perforacji, a także w przypadku niedrożności przewodu pokarmowego.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Informacje dodatkowe Simetic Fortis, 80 mg kapsułki miękkie, 60 szt.

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Stosowanie u kobiet w ciąży: po konsultacji z lekarzem i według jego zaleceń. Stosowanie u chorych na cukrzycę: nie ma potrzeby dostosowywania dawki. Nie zawiera barwników i cukru. Jeśli stosowane są również inne leki, należy zachować przynajmniej jedną godzinę przerwy między kolejnymi dawkami (w przypadku lewotyroksyny konieczny jest 4-godzinny odstęp).