

Sirupus Alte, syrop prawoślazowy, 125 g (w opakowaniu)



Cena: 5,49 zł

Opis słownikowy

Producent	Gemi P.P.F.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis Sirupus Alte, syrop prawoślazowy, 125 g (w opakowaniu)

Opis

SYROP PRAWOŚLAZOWY ALTE® jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny zawierający wyciąg (macerat) z korzenia prawoślazu lekarskiego.

Skład

Substancją czynną leku jest macerat z korzenia prawoślazu lekarskiego.

100 g leku zawiera 36 g maceratu z 5 g *Althaea officinalis* L, radix (korzenia prawoślazu lekarskiego) (5:36).

Ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47,9:1), substancja pomocnicza - kwas

benzoesowy 0,1%. Równowarto?? korzenia prawo?lazu na 100 ml syropu wynosi 6,5 g. 5 ml syropu zawiera 2,36 g maceratu z korzenia prawo?lazu, co odpowiada 325 mg korzenia prawo?lazu.

Pozosta?e sk?adniki to: sacharoza, kwas benzoesowy. Zawarto?? etanolu w produkcji nie wi?cej ni? 0,8% m/m (1,0% V/V)

Dawkowanie

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub wed?ug zalece? lekarza, lub farmaceuty. W razie w?tpliw?ci nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku, gdy objawy utrzymuj? si? d?u?ej ni? tydzie? podczas stosowania produktu, nale?y zwróci? si? do lekarza.

- Dzieci w wieku 3-6 lat: 5 ml, dawk? mo?na stosowa? do 3 razy na dob?.
- Dzieci w wieku 6-12 lat 5 ml, dawk? mo?na stosowa? do 3 razy na dob?.
- M?odzie? powy?ej 12 lat i doro?li: 10 ml, dawk? mo?na stosowa? od 3 do 4 razy na dob?.

Dzia?anie

Tradycyjne dzia?anie syropów, zawieraj?cych maceraty z korzenia prawo?lazu t?umaczy si? dzia?aniem os?aniaj?cym na b?on? ?luzow? jamy ustnej i gard?a i ?agodzeniem stanów podra?nienia. Substancj? czynn? syropu jest wyci?g wodny (macerat) z korzenia prawo?lazu, który zawiera jako g?ówne sk?adniki ?luzy o charakterze kwa?nym. ?luz korzenia prawo?lazu tworzy roztwory koloidalne, które

pokrywają błony śluzowe cienką warstwą i działają na nie ochronnie. Dzięki temu śluz działa osłaniająco na zmienioną błonę śluzową gardła oraz łagodzi kaszel. Jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu.

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany jako środek łagodzący objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz związany z tym suchy kaszel.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku SYROP PRAWOŚLAZOWY ALTE®

- jeżeli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
- jeżeli pacjent ma uczulenie na kwas benzoesowy i jego pochodne.

Działania niepożądane

Jak każdy lek SYROP PRAWOŚLAZOWY ALTE® może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób szczególnie na kwas benzoesowy może wystąpić pobudzone wydzielanie śliny i podrażnienie błędnaka. Przy zbyt częstym dawkowaniu syropu, powyżej zatwierdzonego schematu dawkowania, może dochodzić do działania przeczyszczającego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera sacharozę w związku z tym należy go ostrożnie stosować u chorych na cukrzycę. 5 ml syropu zawiera 4,2 g sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 0,8% m/m (1,0% V/V) etanolu (alkoholu), tzn. do 131 mg na dawkę 10 ml, co jest równoważne ok. 3,3 ml piwa lub ok. 1,3 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobami alkoholowymi. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciążarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub z padaczką. Dawka stosowana u dzieci zawiera maksymalną ilość alkoholu - mniej niż 100 mg na dawkę.

- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w opakowaniu zamkniętym w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceutce o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny się skonsultować z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Stosowanie u dzieci poniżej 3 lat nie jest zalecane.