Smecta Go, zawiesina doustna o smaku karmelowo-kakaowym, 8 saszetek

Cena: 13,99 zł

Opis słownikowy

Marka	Smecta
Postać	zawiesina
Producent	Ipsen
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Diosmektyt

Opis produktu

Informacje podstawowe Smecta Go, zawiesina doustna o smaku karmelowo-kakaowym, 8 saszetek

Wyrób medyczny SmectaGo to gotowa do wypicia zawiesina doustna przeznaczona dla dorosłych i dzieci powyżej 8 roku życia.
Preparat jest wskazany w przypadku ostrej i przewlekłej biegunki.
Smak: karmelowo-kakaowy.

Skład Smecta Go, zawiesina doustna o smaku karmelowo-kakaowym, 8 saszetek

Diosmektyt, aromat kakaowo-karmelowy (mieszanina naturalnych i syntetycznych aromatów, barwnik karmelowy E150d, karmelizowany syrop cukrowy, glikol propylenowy E1520, woda, etanol, kofeina), guma ksantanowa, benzoesan sodu, kwas chlorowodorowy, sorbinian potasu, sukraloza, woda oczyszczona

1 saszetka zawiera 3 g diosmektytu.

Zawartość opakowania
W opakowaniu znajduje się 8 saszetek.

Działanie Smecta Go, zawiesina doustna o smaku karmelowo-kakaowym, 8 saszetek

Diosmetykt zawarty w składzie wiąże substancje toksyczne i drobnoustroje, ułatwia ich eliminację z organizmu oraz osłania i wspiera regenerację przewodu pokarmowego.

Wskazania Smecta Go, zawiesina doustna o smaku karmelowo-kakaowym, 8 saszetek

Produkt wskazany jest do stosowania w przypadku ostrej biegunki u dzieci powyżej 8 roku życia i dorosłych oraz w trakcie przewlekłej biegunki lub bólu brzucha występujących u osób dorosłych.

Dawkowanie Smecta Go, zawiesina doustna o smaku karmelowo-kakaowym, 8 saszetek

Wyrób jest gotowy do wypicia i należy przyjmować go doustnie. Zawartość może zostać przyjęta bezpośrednio z saszetki. Saszetkę przed otwarciem należy lekko ugnieść.
Każda saszetka po otwarciu powinna być przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku.

Stosowanie produktu
Stosować doustnie, produkt jest gotowy do wypicia.

W przypadku ostrej biegunki zalecana dawka dla dzieci w wieku 8-15 lat wynosi: początkowo 2 saszetki, następnie 1 saszetkę po każdym wolnym stolcu, jednak nie więcej niż 4 saszetki na dobę. Dodatkowo, należy pamiętać o podawaniu doustnych płynów nawadniających w celu uzupełnienia płynów. Dla młodzieży powyżej 15 roku życia i dorosłych zaleca się stosować początkowo 2 saszetki, następnie 1 saszetkę po każdym wolnym stolcu, jednak nie więcej niż 6 saszetek na dobę. Czas trwania terapii nie powinien przekraczać 3 dni.

W przypadku występowania przewlekłej biegunki ub bólów brzucha zaleca się osobom dorosłym przyjmować 3 saszetki na dobę - rano, w południe i na wieczór, w zależności od zapotrzebowania. Stosować nie dłużej niż 2 tygodnie

Nie zaleca się długotrwałego ani wielokrotnego stosowania wyrobu medycznego.

Przeciwwskazania Smecta Go, zawiesina doustna o smaku karmelowo-kakaowym, 8 saszetek

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia wyrobu.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
Należy zaprzestać kontynuowania terapii i skontaktować się z lekarzem jeśli objawy nie ustępują, bądź nasilają się po upływie zalecanego czasu stosowania, a także gdy pojawiają się częste nawroty biegunki lub gdy rozwolnienie występuje naprzemiennie z zaparciami.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas podawania wyrobu pacjentom z ciężkimi zaparciami w wywiadzie.
Nie stosować po upływie terminu ważności,

Informacje dodatkowe Smecta Go, zawiesina doustna o smaku karmelowo-kakaowym, 8 saszetek

Jeśli biegunce towarzyszą: gorączka, dreszcze, powtarzające się wymioty, nagła utrata masy ciała, bądź występują objawy odwodnienia (uczucie dużego pragnienia, suchość języka, zmęczenie, przewlekły brak apetytu), stolec zawiera krew lub śluz, biegunka występuje w trakcie lub po zakończeniu antybiotykoterapii, u pacjenta stwierdzono niedobory odporności bądź przyjmuje on leki hamujące odpowiedź układu odpornościowego (immunosupresyjne, chemioterapia) lub gdy wrócił on niedawno z podróży do krajów tropikalnych należy

skontaktować się z lekarzem i w żadnym wypadku nie podejmować prób samodzielnego leczenia.
SmectaGo zawiera niewielkie ilości (mniej niż 100 mg na dawkę dobową) etanolu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Najczęściej występującym działaniem niepożądanym są zaparcia, rzadziej zgłaszano swędzenie, wysypkę, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry, warg, gardła i języka).

Uwagi
W sytuacji pominięcia dawki należy ją przyjąć po kolejnym wypróżnieniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Nie stosować równocześnie z innymi lekami doustnymi, należy zachować pomiędzy przyjęciem leków a zastosowaniem wyrobu minimum 2 godziny przerwy.
Przed zastosowaniem należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach lub wyrobach medycznych stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych dostępnych bez recepty.
Pacjenci przyjmujący leki immunosupresyjne lub są w trakcie leczenia nowotworu przed użyciem powinni skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie wyrobu z jedzeniem i piciem
SmectaGo stanowi jedynie leczenie uzupełniające nawadniania.
W przypadku dzieci z ostrą biegunką produkt należy podawać w połączeniu z doustnym płynem nawadniającym.

W czasie trwania biegunki należy kontynuować przyjmowanie pokarmów. Zaleca się przyjmowanie niewielkich lekkich posiłków, które nie zawierają tłustych, ciężkich, pikantnych lub stymulujących perystaltykę przewodu pokarmowego pokarmów, a także soków owocowych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia biegunki u osób starszych lub osłabionych, gdyż może ona prowadzić do znacznej utraty płynów (odwodnienia) u tych pacjentów. Może się to wiązać z poważnymi konsekwencjami.

Ciąża i karmienie piersią
Zaleca się aby kobiety ciężarne i karmiące piersią skonsultowały się z lekarzem przez zastosowaniem produktu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 8 roku życia. Nie stosować u dzieci poniżej tego wieku.
Nie należy podawać SmectaGo dzieciom, u których występuje przewlekła biegunka lub ból brzucha.

W czasie trwania biegunki dziecko powinno przyjmować pokarmy. Zaleca się częste podawanie niewielkich, zróżnicowanych posiłków (np. ryż, jajka, mięso, gotowane owoce i warzywa). Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nastąpi zmiana w zachowaniu dziecka, jeżeli objawy biegunki nie ustąpią lub ulegną nasileniu lub jeżeli wystąpią częste lub przewlekłe wymioty.

Galeria