

Soledum Forte, 200 mg kapsułki dojelitowe miękkie, 20 szt.

Cena: 34,19 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------|
| Postać | kapsułki |
| Producent | Klosterfrau |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Cyneol |

Opis produktu

Informacje podstawowe Soledum Forte, 200 mg kapsułki dojelitowe miękkie, 20 szt.

Soledum forte to lek wykrztuśny, czyli ułatwiający odkrztuszenie przy kaszlu mokrym. Produkt leczniczy ma postać kapsułek dojelitowych miękkich stosowanych w leczeniu produktywnego kaszlu oraz jako środek wspomagający w ostrym, nieropnym zapaleniu zatok. Soledum forte jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia osób dorosłych jak również dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Skład Soledum Forte, 200 mg kapsułki dojelitowe miękkie, 20 szt.

Substancją czynną leku jest cyneol (Cineolum).

1 kapsułka miękka dojelitowa zawiera 200 mg cyneolu.

Substancje pomocnicze: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol 85%, woda oczyszczona, zawieszina Surelease - Nutrateric (etyloceluloza, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, kwas oleinowy, amonowy wodorotlenek stężony, woda oczyszczona), NS Enteric - Nutrateric (sodu alginian, kwas stearynowy), wosk Candelilla.

Działanie Soledum Forte, 200 mg kapsułki dojelitowe miękkie, 20 szt.

Substancja czynna Soledum forte nazywana jest również eukaliptolem i stanowi podstawowy składnik olejku eukaliptusowego. Cyneol

wspomaga odkrztuszanie i rozrzedza wydzielinę, czyli działa sekretolitycznie. Soldeum forte pomaga również w zmniejszeniu objawów ostrego zapalenia zatok.

Wskazania Soledum Forte, 200 mg kapsułki dojelitowe miękkie, 20 szt.

Soldeum forte podaje się w kaszlu mokrym oraz ostrym zapaleniu zatok.

Dawkowanie Soledum Forte, 200 mg kapsułki dojelitowe miękkie, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie, połykając całą kapsułkę w całości (bez rozgryzania) na 30 minut przed posiłkiem. U osób z wrażliwym układem pokarmowym lek można przyjąć podczas posiłku.

Zalecane dawkowanie Soldeum forte dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat to 1 kapsułka 3 razy dziennie na pół godziny przed posiłkiem. Przy kontynuacji leczenia zwykle stosuje się 1 kapsułę 2 razy dziennie. Maksymalna dawka dobowego leku to 2 do 3 kapsułek.

Czas trwania leczenia powinien być dostosowany do charakteru, nasilenia i rozwoju choroby. Produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień), chyba że lekarz zaleci inaczej. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, jeśli wystąpi duszność, gorączka lub krwawe albo ropne odkrztuszanie.

Przeciwwskazania Soledum Forte, 200 mg kapsułki dojelitowe miękkie, 20 szt.

Nie stosować leku u osób z uczuleniem na cyneol lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniem do podawania Soledum forte jest krtusiec lub pseudo-krtusiec.

Informacje dodatkowe Soledum Forte, 200 mg kapsułki dojelitowe miękkie, 20 szt.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku pacjentów z chorobą związaną ze znaczną nadwrażliwością dróg oddechowych oraz gdy objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, jeśli występuje duszność, ropne czy krwawe odkrztuszanie albo gorączka.

Soledum forte w jednej kapsułce zawiera 17 mg sorbitolu, czyli 0,0015 jednostki chlebowej.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i pić

Soledum forte należy stosować co najmniej 30 minut przed posiłkiem. W przypadku osób z wrażliwym układem pokarmowym, lek można przyjąć podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 12 lat.

MEDEST

BO TWOJE ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48