

Solescin, tabletki dojelitowe, 30 szt.

Cena: 27,49 zł



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	Solinea
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	Bromelina, Kasztanowiec, Ruszczyk, Rutozyd , Witamina C

Opis produktu

Informacje podstawowe Solescin, tabletki dojelitowe, 30 szt.

Solescin - suplement diety zawierający składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Solescin, tabletki dojelitowe, 30 szt.

Ekstrakt z k??cza ruszczyka kolczastego, ekstrakt z nasion kasztanowca zwyczajnego, substancja wype?niaj?ca: celuloza mikrokrystaliczna, bromelaina, witamina C (kwas L-askorbinowy), rutozyd, no?nik: sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancje przeciwzbrylaj?ce: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, talk, dwutlenek krzemu, substancja glazuruj?ca: szelak, regulator kwasowo?ci, w?glany amonu, trójglicerydy ?rednio?a?cuchowe.

Składniki	1 tabletka	% RWS*	2 tabletki	% RWS*
Ekstrakt z ruszczyka kolczastego	150 mg	---	300 mg	---
w tym:	7,5 mg	---	15 mg	---
ruskogenina				
Ekstrakt z kasztanowca zwyczajnego	150 mg	---	300 mg	---
w tym:	30 mg	---	60 mg	---
escyna				
Bromelaina	100 mg	---	200 mg	---
Rutozyd	25 mg	---	50 mg	---
Witamina C	50 mg	62,5%	100 mg	125%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto

20,46 g

Ważciwości składników

Witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz wspomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Ruszczyk kolczasty oraz **kasztanowiec zwyczajny** są bogatym źródłem aktywnych biologicznie związków naturalnych, które wykazują wielokierunkowe działanie potwierdzone w badaniach.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1-2 tabletki dziennie.

Tabletkę należy przyjmować między posiłkami.

Informacje dodatkowe Solescin, tabletki dojelitowe, 30 szt.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Produkt nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.

Elizówka 65, Hala I

21-003 Ciecierzyn