Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Strepsils Intensive Direct, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml

Cena: 39,89 zł

Opis słownikowy

Marka	Strepsils
Postać	aerozol
Producent	Reckitt Benckiser
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Flurbiprofen

Opis produktu

Informacje podstawowe Strepsils Intensive Direct, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml

Strepsils Intensive Direct to produkt leczniczy dla dorosłych od 18 roku życia przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła.

Skład Strepsils Intensive Direct, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml

Substancja czynna: flurbiprofen.

1 rozpylenie zawiera 2,91 mg flurbiprofenu, trzy rozpylenia równe s? jednej dawce zawieraj?cej 8,75 mg, co odpowiada 16,2 mg/ml flurbiprofenu.

Substancje pomocnicze: betadeks, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sodu wodorotlenek, aromat mi?towy, aromat wi?niowy,

N,2,3-trimetylo-2-izopropylobutanoamid, sacharyna sodowa, hydroksypropylobeadeks, woda oczyszczona; sk?ad jako?ciowy aromatu mi?towego: substancja smakowa, preparat smakowy, glikol propylenowy E1520, trioctan glicerolu (triacetyna) E1518; sk?ad jako?ciowy aroatu wi?niowego: substancja smakowa, preparat smakowy, glikol propylenowy E1520, woda.

Trzy rozpylenia równe jednej dawce zawieraj? 1,18 mg metylu parahydroksybenzoesanu(E218), 0,24 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E216) i 2,43 mg glikolu propylenowego (E1520).

Działanie Strepsils Intensive Direct, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml

Strepsils Intensive Direct wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Wskazania Strepsils Intensive Direct, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml

Strepsils Intensive Direct jest przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła, takich jak ból gardła, trudności z przełykaniem i obrzęk u osób dorosłych od 18 roku życia.

Dawkowanie Strepsils Intensive Direct, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 3 rozpylenia aerozolu na tylną część gardła co 3-6 godzin, w razie potrzeby.

Nie przyjmować więcej niż 5 dawek w okresie 24 godzin.
Nie stosować dłużej niż 3 dni.
Nie wdychać podczas rozpylania aerozolu.
Przed pierwszym użyciem należy uruchomić pompkę, kierując dyszę od siebie i rozpylić minimum cztery razy, aż do uzyskania jednolitej, lekkiej mgiełki.

Przeciwwskazania Strepsils Intensive Direct, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml

Kiedy nie stosować leku Strepsils Intensive Direct

w przypadku uczulenia na flurbiprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek ze składników preparatu,
u pacjentów z wrzodami żołądka,
u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia,
u pacjentek w ostatnim trymestrze ciąży.

Informacje dodatkowe Strepsils Intensive Direct, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml

Skonsultować się z lekarzem w przypadku, gdy pacjent przyjmuje już inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub kwas acetylosalicylowy.
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Nie stosować leku dłużej niż 6 miesięcy po pierwszym użyciu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.