

Sutricon, silikonowy żel do pielęgnacji blizn, 15 ml

Cena: 23,70 zł



Opis słownikowy

Marka	Sutricon
Postać	żel
Producent	Verco
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Dimetinden

Opis produktu

Informacje podstawowe Sutricon, silikonowy żel do pielęgnacji blizn, 15 ml

wyrób medyczny
do codziennej pielęgnacji blizn.
hipoalergiczny.

Skład Sutricon, silikonowy żel do pielęgnacji blizn, 15 ml

Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Silica.

Działanie Sutricon, silikonowy żel do pielęgnacji blizn, 15 ml

Sutricon, silikonowy żel

do pielęgnacji wszystkich rodzajów blizn
tuba z kaniulą zapewnia łatwą aplikację i pozwala na stosowanie produktu na nierówne, często poddawane naprężeniom powierzchnie skóry.
szybko wysycha i tworzy na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę, która utrzymuje odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroni powierzchnię blizny przed czynnikami zewnętrznymi.
poprawia wygląd nowych i istniejących już blizn.

regularnie stosowany pomaga w pielęgnacji blizn oraz zmniejsza ryzyko powstawania bliznowców i blizn przerostowych. wspomaga zmniejszenie, rozjaśnienie oraz wygładzenie blizn przy regularnym stosowaniu

Wskazania Sutricon, silikonowy żel do pielęgnacji blizn, 15 ml

Sutricon, silikonowy żel przeznaczony jest do pielęgnacji:

blizn pooperacyjnych
blizn poparzeniowych i powstałych po urazach
blizn przerostowych i keloidów (bliznowców)
blizn potrądzikowych
rozstępów.

Dawkowanie Sutricon, silikonowy żel do pielęgnacji blizn, 15 ml

Stosowanie produktu powinno się rozpocząć jak najszybciej po zagojeniu rany lub zdjęciu szwów.
Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieść niewielką ilość preparatu.
Kolistymi ruchami delikatnie masować powierzchnię blizny przez około 2-3 min.
Rozcierać bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców.
Zaleca się stosować preparat minimum dwa razy dziennie.

Informacje dodatkowe Sutricon, silikonowy żel do pielęgnacji blizn, 15 ml

Produkt nie powinien być używany przez osoby, u których występuje alergia na którykolwiek ze składników preparatu.
Do użytku zewnętrznego.
W przypadku wystąpienia podrażnienia i reakcji alergicznej należy zaprzestać stosowania preparatu.
Unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i ranami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.