


SutriHeal Forte 5%, maść do gojenia ran, 30 g

Cena: 49,79 zł



Opis słownikowy

Marka	SutriHeal
Postać	maść
Producent	Verco
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Glikol propylenowy, Makrogol

Opis produktu

Informacje podstawowe SutriHeal Forte 5%, maść do gojenia ran, 30 g

Wyrób medyczny SutriHeal Forte 5% jest to maść zawierająca naturalną żywicę świerku norweskiego (Picea abies), w której znajdują się związki przyspieszające gojenie się ran.

Skład SutriHeal Forte 5%, maść do gojenia ran, 30 g

Makrogol 400, Makrogol 3350, rafinowana żywica świerku norweskiego (Picea abies), glicerol, alkohol denaturowany.

Zawartość opakowania

W opakowaniu znajduje się 15 g maści.

Działanie SutriHeal Forte 5%, maść do gojenia ran, 30 g

Maść SutriHeal Forte 5% wspomaga gojenie się ran różnego pochodzenia, zarówno tych niezakażonych, jak i zakażonych.

Wskazania SutriHeal Forte 5%, maść do gojenia ran, 30 g

Produkt przeznaczony jest do stosowania na rany ostre: skaleczenia, zadrapania, rany po zabiegach chirurgicznych lub ortopedycznych; rany powierzchniowe: zanokcice, choroby płytek paznokciowych, otarcia, pęknięcia naskórka lub powierzchniowe pęknięcie naskórka oraz na rany przewlekłe: odleżyny, oparzenia, zespół stopy cukrzycowej i owrzodzenia podudzi.

Dawkowanie SutriHeal Forte 5%, maść do gojenia ran, 30 g

1. Oczyszczyć i osuszyć ranę.
2. Nałożyć maść bezpośrednio na zmieniony obszar.
3. W razie potrzeby zabezpieczyć ranę bandażem lub przepuszczającą powietrze gazą.

Stosowanie produktu

Stosować 1-2 razy dziennie.

Przeciwwskazania SutriHeal Forte 5%, maść do gojenia ran, 30 g

Unikać dostania się maści do ust i oczu.

Nie należy stosować maści w warunkach, w których możliwe jest wchłanianie dużych ilości glikolu polietylenowego, szczególnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Informacje dodatkowe SutriHeal Forte 5%, maść do gojenia ran, 30 g

Przetoki i rany powstałe w wyniku pęknięcia pęcherzy powinny być leczone zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

W przypadku znanej nadwrażliwości na żywicę należy przetestować maść na niewielkim obszarze skóry - jeśli w ciągu 3 dni wystąpią objawy alergiczne (swędzenie, rumień, obrzęk, pęcherze, itp.), nie należy stosować produktu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zużyć w ciągu 1 roku od momentu otwarcia.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

Do możliwych działań niepożądanych należą: reakcje alergiczne na składniki żywicy (np. miejscowe podrażnienie skóry na leczonym obszarze). W przypadku wystąpienia objawów alergii należy natychmiast przerwać stosowanie maści.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.