

Tadalafil Maxigra, 10 mg tabletki powlekane, 2 szt.



Cena: 29,49 zł

Opis słownikowy

Marka	Maxigra
Postać	tabletki
Producent	Polpharma
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Tadalafil

NA EREKCJĘ, DZIAŁA DO 36H

Opis produktu

Informacje podstawowe Tadalafil Maxigra, 10 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Tadalafil Maxigra jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Wykazano, że lek Tadalafil Maxigra znacznie poprawia zdolność uzyskania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.

Skład Tadalafil Maxigra, 10 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Substancja czynna: tadalafil. Każda tabletkę leku zawiera 10 mg tadalafilu.

Pozostałe składniki:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, powidon K 30, poloksamer typ 188, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian;

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

Działanie Tadalafil Maxigra, 10 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Tadalafil Maxigra zawiera substancję czynną tadalafil, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji seksualnej, Tadalafil Maxigra pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka. W

wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji. Tadalafil Maxigra nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.

Wskazania Tadalafil Maxigra, 10 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Produkt Tadalafil Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dawkowanie Tadalafil Maxigra, 10 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki leku Tadalafil Maxigra są przeznaczone do przyjmowania doustnego tylko u mężczyzn.

Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletki można zażywać niezależnie od posiłków.

Zalecana dawka to jedna tabletką 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną.

Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.

Lek do stosowania doraźnego, w miarę potrzeby.

Nie przyjmować więcej niż 1 tabletkę. Leku nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu.

Przeciwwskazania Tadalafil Maxigra, 10 mg tabletki powlekane, 2 szt.

Leku nie należy stosować:

Jeśli pacjent ma uczulenie na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiegokolwiek leki z tej grupy.

Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej. Wykazano, że lek Tadalafil Maxigra nasila działanie tych leków. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent przyjmuje leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub pacjent przebył zawał serca w ciągu ostatnich 90 dni.

Jeśli pacjent przebył udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi.

Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętnicznej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określaną jako „porażenie oka”.

Jeśli pacjent przyjmuje riociguat (np. Adempas). Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), takie jak Tadalafil Maxigra, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riociguat lub nie jest pewien, powinien poinformować o tym lekarza.

U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Galeria

tadalafil
maxigra
tadalafilum

ZAWIERA TADALAFIL -
NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCA
SUBSTANCJĘ
NA EREKCJĘ²

działa do
36h¹

TERAZ DZIAŁASZ DŁUŻEJ

tadalafil
maxigra
tadalafilum

2 DŁUŻE
NA EREKCJĘ
DZIAŁA DO
36 GODZIN

działa nawet po
16min¹

działa do
36h¹

TERAZ DZIAŁASZ DŁUŻEJ

tadalafil
maxigra
tadalafilum

**TERAZ DZIAŁASZ
NAWET PRZEZ
CAŁY WEEKEND**

działa do
36h¹

TERAZ DZIAŁASZ DŁUŻEJ

tadalafil
maxigra
tadalafilum

**JEDZENIE I ALKOHOL
NIE WPŁYWAJĄ
NA DZIAŁANIE LEKU**³

Jeżeli planujesz przyjąć lek,
nie spożywaj dużych ilości alkoholu
(stężenie alkoholu we krwi $\geq 0,08\%$), ponieważ może to
zwiększyć ryzyko zawrotów głowy przy wstawaniu.