

Tasectan, 500 mg kapsułki, 15 szt.

Tasectan® na biegunkę

Cena: 36,29 zł



Producent: Novinture, S.L.

Podmiot prowadzący reklamę produktu: Bausch Health Poland sp. z o.o., NIP: 813 36 76 203

Tas-PL-2305-118

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Opis słownikowy

Marka	Tasectan
Postać	kapsułki
Producent	Bausch Health
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Taninian

Opis produktu

Informacje podstawowe Tasectan, 500 mg kapsułki, 15 szt.

Wyrób medyczny na biegunkę u dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.

Skład Tasectan, 500 mg kapsułki, 15 szt.

Skład: kapsułka zawiera 500mg taninianu żelatyny.

Wskazania Tasectan, 500 mg kapsułki, 15 szt.

Tasectan 500 mg, kapsułki:

- to wyrób medyczny na biegunkę u dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia o udowodnionej skuteczności,
- zmniejsza częstotliwość i czas trwania biegunki.

Tasectan jest wyrobem medycznym stosowanym w celu przywrócenia fizjologicznych funkcji ścian jelita.

Jego skład został opracowany w celu kontrolowania i łagodzenia objawów biegunki o różnej etiologii, takich jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Czas jego działania wynosi 12 godzin. W skład produktu wchodzi taninian żelatyny, który nie ulega przemianie w żołądku i działa poprzez tworzenie warstwy chroniącej błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.

Dawkowanie Tasectan, 500 mg kapsułki, 15 szt.

Instrukcja użycia

Kapsułkę należy połknąć, popijając wodą.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia: 1-2 kapsułki co 4-6 godzin, do ustąpienia objawów.

Przeciwwskazania Tasectan, 500 mg kapsułki, 15 szt.

Przeciwwskazania

Tasectan nie powinien być stosowany u osób ze znaną nadwrażliwością na taninian żelatyny lub jakiegokolwiek inne składniki produktu. Środki ostrożności:

- Konsultacja medyczna przed zastosowaniem tego produktu nie jest konieczna, niemniej jest ona zalecana w przypadku ciężkich lub uporczywych objawów lub w przypadku wątpliwości co do rozpoznania choroby.
- W przypadku biegunki u dzieci poniżej 3 roku życia i u osób starszych zalecana jest konsultacja medyczna, szczególnie przy współistnieniu innych objawów.
- Stosowanie tego wyrobu medycznego nie stanowi leczenia farmakologicznego. Jeżeli takie leczenie jest zalecane przez fachowy personel medyczny, ten wyrób medyczny może być stosowany jednocześnie z leczeniem farmakologicznym.
- Zaleca się przyjmowanie dużej ilości płynów oraz postępowanie dietetyczne odpowiednie dla pacjentów z biegunką.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Nie należy stosować produktu w przypadku gdy saszetka jest otwarta lub uszkodzona.
- Ten wyrób medyczny nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Nie zamrażać.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Pomimo braku znanych zdarzeń niepożądanych nie poleca się stosowania tego produktu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej.

Informacje dodatkowe Tasectan, 500 mg kapsułki, 15 szt.

Producent:




Noventure, S.L.
Avenida Diagonal, 549, 5a planta
08029 Barcelona - Hiszpania

Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie:

Bausch Health Poland sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

Galeria

CO WYRÓŻNIA Tasectan®:

-  Łagodni objawy takie jak: częste wypróżnienia i napięcie powłok brzusznych.
-  Tasectan® w postaci kapsułek można stosować u dorosłych i dzieci od 14. roku życia.
-  Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Tasectan® została potwierdzona w badaniach klinicznych.^{1,4}

© Carvenis S. Rappone P.O. Biondo S. Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518
1. Carvenis S, Rappone P, Biondo S, Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518
2. Carvenis S, Rappone P, Biondo S, Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518
3. Carvenis S, Rappone P, Biondo S, Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518
4. Carvenis S, Rappone P, Biondo S, Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

UNIKALNA FORMUŁA Tasectan®

Unikalna formuła na biegunkę NEO® zapewnia kompleksowe działanie na błonę jelitą.



1. Carvenis S, Rappone P, Biondo S, Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

UNIKALNA FORMUŁA Tasectan®

Unikalna formuła na biegunkę NEO® zapewnia kompleksowe działanie na błonę jelitą.


- N** **NORMALIZUJE**
Przywraca fizjologiczne funkcje ścian jelita.
- E** **ELIMINUJE**
Łagodzi objawy biegunki o różnej etiologii, takie jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Czas jego działania wynosi 12 godzin.
- O** **POCHRONIA**
Tworzy warstwę chroniącą błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.

1. Carvenis S, Rappone P, Biondo S, Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI W BADANIACH KLINICZNYCH:



Tasectan® zmniejsza częstość i skraca czas trwania epizodów biegunki u dorosłych^{1,2}

1. Carvenis S, Rappone P, Biondo S, Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518
2. Carvenis S, Rappone P, Biondo S, Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

DLA KOGO Tasectan® W POSTACI KAPSUŁEK?



Tasectan® 500 mg to produkt przeciwbiegunkowy, który można stosować u dorosłych i dzieci od 14. roku życia w celu łagodzenia objawów biegunki różnego pochodzenia.

1. Carvenis S, Rappone P, Biondo S, Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

JAK STOSOWAĆ Tasectan® W POSTACI KAPSUŁEK?



Dorośli i dzieci od 14. roku życia
 1-2 kapsułki co 4-6 godzin do ustąpienia objawów.
 Maksymalna dawka dobowo to 12 kapsułek dziennie.

1. Carvenis S, Rappone P, Biondo S, Mottino S. A comparative analysis of response to 1000 mg oral rifaximin solution and 500 mg capsules in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation. World J Gastroenterol 2013; 17(4): 511-518

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.