

## Theraflu ExtraGRIP, 650mg+10mg+20mg proszek w saszetkach do sporządzania roztworów doustnych, 14 szt.

Cena: 23,41 zł



### Opis słownikowy

Marka	Theraflu
Postać	proszek
Producent	Novartis
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Feniramina, Fenylefryna, Paracetamol

### Opis produktu

## Informacje podstawowe Theraflu ExtraGRIP, 650mg+10mg+20mg proszek w saszetkach do sporządzania roztworów doustnych, 14 szt.

Theraflu ExtraGRIP to lek stosowany przy objawach grypy i przeziębienia. Lek działa wielokierunkowo, ponieważ zawiera 3 substancje czynne. Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, chlorowodorek fenylefryny zmniejsza przekrwienie oraz obrzęk błony śluzowej nosa, natomiast feniramina łagodzi kichanie, świąd błony śluzowej nosa i zatok.

## Skład Theraflu ExtraGRIP, 650mg+10mg+20mg proszek w saszetkach do sporządzania roztworów doustnych, 14 szt.

Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum), maleinian feniraminy (Pheniramin maleas).

1 saszетка zawiera: 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodoreku fenylefryny, 20 mg maleinian feniraminy.

Substancje pomocnicze: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.

## **Działanie Theraflu ExtraGRIP, 650mg+10mg+20mg proszek w saszetkach do sporządzania roztworów doustnych, 14 szt.**

Theraflu ExtraGRIP zawiera 3 substancje aktywne i działa wielokierunkowo:

Paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo,  
chlorowodorek fenylefryny - zmniejsza przekrwienie oraz obrzęk błony śluzowej nosa,  
maleinian feniraminny – substancja antyhistaminowa, która łagodzi objawy uczuleniowe, takie jak: kichanie, świąd lub przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok.

## **Wskazania Theraflu ExtraGRIP, 650mg+10mg+20mg proszek w saszetkach do sporządzania roztworów doustnych, 14 szt.**

Theraflu ExtraGRIP stosuje się w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostnowstawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina z nosa, kichanie.

## **Dawkowanie Theraflu ExtraGRIP, 650mg+10mg+20mg proszek w saszetkach do sporządzania roztworów doustnych, 14 szt.**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Theraflu ExtraGRIP stosuje się doustnie, po rozpuszczeniu zawartości saszetki w 1 szklance gorącej, ale nie wrzącej wody

Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają po 5 dniach albo gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni pomimo stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 saszetka, jeśli jest taka potrzeba dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach.  
Maksymalna dawka dobową 3 saszetki.

## **Przeciwwskazania Theraflu ExtraGRIP, 650mg+10mg+20mg proszek w saszetkach do sporządzania roztworów doustnych, 14 szt.**

Kiedy nie stosować leku Theraflu ExtraGRIP:

u osób nadwrażliwych na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i maleinian feniraminny albo którykolwiek ze składników preparatu, jeśli pacjent przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminoooksydazy,  
u osób z: ciężką chorobą serca, bardzo wysokim ciśnieniem tętniczym, nadczynnością tarczycy, jaskrą z wąskim kątem przesączania, guzem chromochłonny nadnerczy.

## **Informacje dodatkowe Theraflu ExtraGRIP, 650mg+10mg+20mg proszek w saszetkach do sporządzania roztworów doustnych, 14 szt.**

Przed zastosowaniem leku Theraflu ExtraGRIP należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek, niedokrwistość hemolityczna, choroba układu krwiotwórczego, cukrzyca, przerost

gruczołu krokowego, niedrożność przewodu pokarmowego, wrzody żołądka, padaczka, występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (dziedziczne zaburzenie), pacjent jest odwodniony lub długotrwale niedożywiony, u chorego występują problemy z oddychaniem (astma, rozedma lub przewlekłe zapalenie oskrzeli), gorączka zwiększa się albo utrzymuje dłużej niż 3 dni, ból bądź zatkanie nosa ulegnie nasileniu albo będzie trwać więcej niż 5 dni lub będzie mu towarzyszyć wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy.  
Lek zawiera paracetamol, więc nie należy stosować go z innymi produktami, zawierającymi ten składnik, aby uniknąć ryzyka przedawkowania.

Theraflu ExtraGRIP zawiera sacharozę (12,6 g w 1 saszetce), więc pacjenci z cukrzycą powinni wziąć to pod uwagę. Natomiast, jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja pewnych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego produktu leczniczego.

Lek zawiera żółcień pomarańczową, co może powodować reakcje uczuleniowe.

W 1 saszetce leku znajduje się 42,2 mg dou, więc osoby kontrolujące zawartość sodu w diecie powinny na to zwrócić uwagę.

Podczas stosowania lek nie wolno spożywać alkoholu, ze względu na ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

## Galeria

