Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Cena: 39,59 zł

Opis słownikowy

Marka	Trilac
Postać	kapsułki
Producent	Krotex
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Probiotyki

Opis produktu

Informacje podstawowe Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Trilac to lek w postaci kapsułek, który zawiera 3 szczepy bakterii probiotycznych: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii, Bifidobacterium lactis. Trilac stwarza korzystne warunki w przewodzie pokarmowym do rozwoju prawidłowej flory jelitowej oraz zapobiega osiedlaniu się i rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych. Produkt leczniczy stosuje się po antybiotykoterapii a także aby zapobiec biegunce podróżnych.

Skład Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Substancjami czynnymi leku są: bakterie kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Bifidobacterium lactis.

1 kapsułka zawiera 1,6 x 109 CFU* bakterii kwasu mlekowego:

- Lactobacillus acidophilus La-5: 37,5%,
- Lactobacillus delbruecki subs. Bulgaricus Lb-Y27: 25%,
- Bifidobacterium lactis Bb-12: 37,5%.

*CFU – jednostka formowania kolonii (ang. Colony forming unit)

Substancje pomocnicze: mleko w proszku odtłuszczone, wyciąg z drożdży, sodu askorbinian, inozytol, sodu glutaminian, sodu alginian, magnezu stearynian, glukoza bezwodna. Osłonka kapsułki: tytanu dwutlenek, żelatyna.

Działanie Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Bakterie kwasu mlekowego w leku Trilac powodują obniżenie pH w przewodzie pokarmowym, co stwarza korzystne warunki do rozwoju prawidłowej flory jelitowej a także zapobiega osiedlaniu się i rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych. Szczepy bakterii w Trilac odpowiadają za:

- kolonizację i rozmnażanie się w jelitach Lactobacillus acidophilus, który także stwarza dogodne warunki do rozwoju Bifidobacterium lactis. U osób starszych ilość bakterii Bifidobacterium lactis w przewodzie pokarmowym maleje, więc Trilac pomaga odbudować ich kolonię.
- produkcję naturalnych substancji o charakterze antybiotycznym - Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus nie występuje naturalnie w florze jelitowej, ale jest ważny dla środowiska przewodu pokarmowego.

Wskazania Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

- poantybiotykowe zapalenie jelit (ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomo-błoniastego zapalenia okrężnicy, głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy),
- zapobieganie biegunce podróżnych,
- leczenie wspomagające po antybiotykoterapii.

Dawkowanie Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie. Najlepiej spożywać z dużą ilością płynu podczas posiłku lub godzinę przed posiłkiem.

Dawkowanie: 1-2 kapsułki 3 razy na dobę przez 2 tygodnie do 1 miesiąca, następnie można stosować do 2 kapsułek na dobę.

Przeciwwskazania Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Kiedy nie należy stosować leku Trilac:

- jeśli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- u pacjentów z nadwrażliwością na białko mleka krowiego.

Informacje dodatkowe Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do chwili obecnej w doniesieniach literaturowych nie opisano działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować odstęp czasowy podczas terapii antybiotykowej, ponieważ jednoczesne stosowanie preparatów osłabia działanie.

- Lek przechowywać w temperaturze 2°C-8°C. W trakcie leczenia Trilac można przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Trilac stosowany jednocześnie z antybiotykiem może wykazywać słabsze działanie probiotyczne.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się

lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.