Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

# Ulgix Laxi, 50 mg kapsułki miękkie, 30 szt.

Cena: 14,39 zł

## Opis słownikowy

| | |
|---|---|
| Marka | Ulgix |
| Postać | kapsułki |
| Producent | Hasco |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | Dokuzan |

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Ulgix Laxi, 50 mg kapsułki miękkie, 30 szt.

Lek Ulgix Laxi lek ułatwia wypróżnianie oraz nie pobudza perystaltyki jelit.

### Skład Ulgix Laxi, 50 mg kapsułki miękkie, 30 szt.

Substancją czynną leku jest sodu dokuzynian.

Jedna kapsułka zawiera 50 mg sodu dokuzynianu.

Inne składniki leku to: makrogol 400, glicerol, glikol propylenowy, żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący, woda oczyszczona.

### Działanie Ulgix Laxi, 50 mg kapsułki miękkie, 30 szt.

Dokuzynian sodu jest związkiem powierzchniowo czynnym. Działa emulgująco i zmniejsza napięcie powierzchniowe na granicy nabłonka przewodu pokarmowego i mas kałowych. Dzięki temu ułatwia przenikanie wody i tłuszczów w głąb mas kałowych w jelicie grubym, co zmienia konsystencję stolca i ułatwia wypróżnienie. Dokuzynian nie pobudza perystaltyki jelit.

### Wskazania Ulgix Laxi, 50 mg kapsułki miękkie, 30 szt.

Lek jest zalecany dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Ulgix Laxi stosuje się w zapobieganiu zaparciom i leczeniu przewlekłych zaparć, wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia niewskazany jest wysiłek przy oddawaniu stolca oraz w przygotowaniu do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

## Dawkowanie Ulgix Laxi, 50 mg kapsułki miękkie, 30 szt.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie.

- Dorośli: od 1 do 4 kapsułek na dobę (od 50 mg do 200 mg)
- Dzieci od 6 do 12 lat: od 1 do 2 kapsułek na dobę (od 50 mg do 100 mg)

Każdą dawkę leku należy popijać pełną szklanką wody lub soku owocowego.
Działanie leku występuje po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki.

## Przeciwwskazania Ulgix Laxi, 50 mg kapsułki miękkie, 30 szt.

Kiedy nie stosować leku Ulgix Laxi:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku w przypadku nudności i wymiotów
- w przypadku wystąpienia zapalenia wyrostka robaczkowego
- w przypadku wystąpienia niedrożności jelit oraz stanów zagrażających wystąpieniem niedrożności jelit (nagromadzenie mas kałowych, zapalenie jelit, zwężenie jelit, zrosty otrzewnowe, przepukliny, polipy, guzy)
- w razie ostrego bólu o nieznanej przyczynie w jamie brzusznej
- w przypadku krwawienia z powodu pokarmowego o nieznanej przyczynie
- w przypadku stanów odwodnienia organizmu

## Informacje dodatkowe Ulgix Laxi, 50 mg kapsułki miękkie, 30 szt.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ULGIX LAXI może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podczas stosowania dokuzynianu sodu w dawkach terapeutycznych występują rzadko i obejmują:

- dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego – nudności, wymioty, uczucie gorzkiego smaku, bóle w nadbrzuszu, kolkowe bóle jelit, biegunkę
- skórne reakcje uczuleniowe – wysypki

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera sorbitol. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Dokuzynian sodu przenika do mleka matki i dlatego nie zaleca się stosowania leku przez kobiety karmiące piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Lek nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 roku życia.