Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Valerin max, 360 mg tabletki powlekane, 10 szt.

Cena: 15,49 zł

Opis słownikowy

Marka	Valerin
Postać	tabletki
Producent	Aflofarm
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kozłek

Opis produktu

Informacje podstawowe Valerin max, 360 mg tabletki powlekane, 10 szt.

Valerin max to produkt leczniczy o właściwościach uspokajających.

Skład Valerin max, 360 mg tabletki powlekane, 10 szt.

Substancją czynną jest wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka (Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum), 8-11:1) .

1 tabletka zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka (Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum), 8-11:1) w połączeniu z nośnikami (30%). Nośnikami są maltodekstryna (29%) i krzemionka koloidalna bezwodna (1%). Ekstrahent: etanol 60% (V/V).

Substancje pomocnicze: mannitol, skrobia kukurydziana wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąz HT(E155), Capol 1295 (wosk biały pszczeli i wosk karnauba).

1 tabletka zawiera 179,43 mg laktozy jednowodnej.

Działanie Valerin max, 360 mg tabletki powlekane, 10 szt.

Valerin max jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym.

Apteka internetowa MEDEST
Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

Wskazania Valerin max, 360 mg tabletki powlekane, 10 szt.

Valerin max jest przeznaczony do stosowania w łagodnych stanach napięcia nerwowego i uczucia niepokoju.

Dawkowanie Valerin max, 360 mg tabletki powlekane, 10 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę.

- Maksymalnie 4 razy dziennie po 1 tabletce.
- Dla uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego zaleca się leczeie przez 2-4 tygodnie.
- Jeżeli objawy się nasilą lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Valerin max, 360 mg tabletki powlekane, 10 szt.

Kiedy nie stosować leku Valerin max

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
- u dzieci poniżej 12 lat.

Informacje dodatkowe Valerin max, 360 mg tabletki powlekane, 10 szt.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, skurcze brzucha)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.