

## Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 2 szt.

Cena: 23,59 zł



### Opis słownikowy

Marka	Valinger
Postać	tabletki
Producent	Orion Corporation
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Sildenafil

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 2 szt.

Valinger to tabletki na potencję. Lek stosuje się u mężczyzn mających problemy z osiągnięciem lub utrzymaniem erekcji. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z narzędziem diagnostycznym stanowiącym część ulotki.

### Skład Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 2 szt.

Substancją czynną jest sildenafil.

1 tabletkę zawiera 25 mg sildenafilu.

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa. Otoczka: hypromeloza (2910; 6 mPa s), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna lak glinowy (E 132).

### Działanie Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 2 szt.

Valinger rozkurcza mięśniówkę naczyń krwionośnych w prąciu co ułatwia napływ krwi do penisa. Ułatwia to osiągnięcie erekcji oraz utrzymanie wzwodu. Wymagana jest stymulacja seksualna.

## Wskazania Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 2 szt.

Lek stosuje się w przypadku zaburzeń wzrodu (impotencji) czyli problemu z uzyskaniem lub utrzymaniem wzrodu w pręciu umożliwiającym odbycie stosunku seksualnego.

## Dawkowanie Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 2 szt.

Valinger należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka to 1 tabletka (25 mg) przyjmowana około godziny przed planowanym stosunkiem, popita szklanką wody.

Tabletki na potencję Valinger nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Do zadziała leku wymagane jest pobudzenie seksualne. Tabletki na erekcję zazwyczaj zaczynają działać po 30 min do godziny. Działa leku może ulec opóźnieniu jeśli zostanie przyjęty razem z dużym posiłkiem.

## Przeciwwskazania Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 2 szt.

Kiedy nie stosować leku Valinger?

jeśli pacjent ma uczulenie na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

jeśli pacjent przyjmuje riociguat.

jeśli pacjent ma poważne problemy z sercem lub wątroba.

jeśli pacjent miał niedawno udar lub zawał serca lub jeśli ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

jeśli u pacjenta występują niektóre, rzadkie dziedziczne choroby oczu (takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki).

jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION).

## Informacje dodatkowe Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 2 szt.

### Działa niepożądane

Jak każdy lek, Valinger może powodować działa niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W poniżej tabeli wymienione są najczęściej występujące skutki uboczne leku. Pełna lista dostępna jest w ulotce leku.

Dzia?ania niepo??dane leku Valinger	Cz?sto	Ciepłota, nudno?ci, m
		uderzenia g nag?e uczu cia?a), nies widzenia (w po?wiat?, n

## Niezbyt często

## Rzadko

niewyraźne  
ostrości widzenia  
nosa, zawno

wymioty, w  
oczu, przek  
widzenie b  
widzenie, n  
?zawienie  
szybkie bic  
tętnnicze krw  
krwi, bóle n  
czucie doty  
dzwonienie  
ustnej, zatk  
zapalenie b  
obejmuj? k  
ból w górne  
refluksowa  
zgag?), kre  
krwawienie  
oraz uczuc

omdlenie, u  
nieregularn  
zmniejszen  
mózgu, ucz  
zdrętwienie  
człowieka  
siatkówki w  
zaburzenia  
widzenie, z  
widzenia, n  
wnętrzu ok  
zwiększone

(jaskra), kr  
oczu, niewi  
polu widze  
wokó? ?ró  
rozszerzen  
bia?ka oka  
obecno??  
nosa, obrz  
dra?liwo?c  
utrata s?uc

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku chorób takich jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, białaczka, szpiczak mnogi, anatomiczne zniekształcenie prącia, choroba Peyroniego, problemów z sercem, wrzodów żołądka, zaburzeń krzepnięcia lub problemów ze wzrokiem należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Leku Valinger nie stosować łącznie z innymi lekami stosowanymi w terapii impotencji lub w tętnicznym nadciśnieniu płucnym.

Lek nie powinien być stosowany w u osób nie mających problemów z erekcją.

#### Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Valinger może wchodzić w interakcję z lekami stosowanymi w leczeniu bólów występujących w klatce piersiowej (dławicy piersiowej). Leku nie należy łączyć z lekami z grupy azotanów oraz lekami uwalniającymi tlenek azotu – ich jednoczesne stosowanie może spowodować nagły spadek ciśnienia.

Lek może również wchodzić w interakcje z lekami stosowanymi w terapii HIV (inhibitory proteaz), riocyguatem, lekami alfa-adrenolitycznymi.

#### Stosowanie leku z jedzeniem i pićm

Valinger może być przyjmowany niezależnie od pokarmu. Obfity posiłek może opóźnić działanie leku. Alkohol może zaburzać zdolność do uzyskania erekcji.

#### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Valinger może powodować zaburzenia widzenia i zawroty głowy.