

Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 4 szt.

Cena: 12,09 zł



Opis słownikowy

Marka	Valinger
Postać	tabletki
Producent	Orion Corporation
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Sildenafil

Opis produktu

Informacje podstawowe Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 4 szt.

Valinger to tabletki na potencję. Lek stosuje się u mężczyzn mających problemy z erekcją (jej utrzymaniem bądź osiągnięciem). Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z narzędziem diagnostycznym stanowiącym część ulotki.

Skład Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 4 szt.

Substancją czynną jest sildenafil.

1 tabletkę zawiera 25 mg sildenafilu.

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroscarmeloza sodowa. Otoczka: hypromeloza (2910; 6 mPa s), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna lak glinowy (E 132).

Działanie Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 4 szt.

Valinger rozkurcza mięśniówkę naczyń krwionośnych w prąciu co ułatwia napływ krwi do penisa. Ułatwia to osiągnięcie erekcji oraz utrzymanie wzwodu. Wymagana jest stymulacja seksualna.

Wskazania Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 4 szt.

Lek stosuje się w przypadku zaburzeń wzrodu (impotencji) czyli problemu z uzyskaniem lub utrzymaniem wzrodu w prącia umożliwiającego odbycie stosunku seksualnego.

Dawkowanie Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 4 szt.

Valinger należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka to 1 tabletkę (25 mg) przyjmowana około godziny przed planowanym stosunkiem, popita szklanką wody.

Tabletek na potencję Valinger nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Do zadziała leku wymagane jest pobudzenie seksualne. Tabletki na erekcję zazwyczaj zaczynają działać po 30 min do godziny. Dziaanie leku może ulec opóznieniu jeśli zostanie przyjęty razem z dużym posiłkiem.

Przeciwwskazania Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 4 szt.

Kiedy nie stosować leku Valinger?

jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

jeśli pacjent przyjmuje riocyguat.

jeśli pacjent ma poważne problemy z sercem lub wątrobą.

jeśli pacjent miał niedawno udar lub zawał serca lub jeśli ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

jeśli u pacjenta występują niektóre, rzadkie dziedziczne choroby oczu (takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki).

jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION).

Informacje dodatkowe Valinger, 25 mg tabletki powlekane na erekcję, 4 szt.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Valinger może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W poniżej tabeli wymienione są najczęściej występujące skutki uboczne leku. Pełna lista dostępna jest w ulotce leku.

Działania niepożądane leku Valinger	Częstość	Opis
		nudności, mędrzenia, nagłe uczucie ciemności, niewyraźnego widzenia (wzrost ciśnienia), mędrzenia, mędrzenia

Niezbyt cz?sto

Rzadko

niewyra?ne
ostro?ci wie
nosa, zawr

wymioty, w
oczu, przek
widzenie b
widzenie, n
?zawienie
szybkie bic
t?tnicze krw
krwi, bóle n
czucie doty
dzwonienie
ustnej, zatk
zapalenie b
obejmuj? k
ból w górne
refluksowa
zgag?), kre
krwawienie
oraz uczuc

omdlenie, u
nieregularn
zmniejszen
mózgu, ucz
zdr?twienie
cz??ci oka
siatkówki w
zaburzenia
widzenie, z
widzenia, n
wn?trzu ok
zwi?kszone

(jaskra), kr
oczu, niewi
polu widze
wokó? ?ró
rozszerzen
bia?ka oka
obecno??
nosa, obrz
dra?liwo?c
utrata s?uc

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku chorób takich jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, białaczka, szpiczak mnogi, anatomiczne zniekształcenie prącia, choroba Peyroniego, problemów z sercem, wrzodów żołądka, zaburzeń krzepnięcia lub problemów ze wzrokiem należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Leku Valinger nie stosować łącznie z innymi lekami stosowanymi w terapii impotencji lub w tętnicznym nadciśnieniu płucnym.

Lek nie powinien być stosowany w u osób nie mających problemów z erekcją.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Valinger może wchodzić w interakcję z lekami stosowanymi w leczeniu bólów występujących w klatce piersiowej (dławicy piersiowej). Leku nie należy łączyć z lekami z grupy azotanów oraz lekami uwalniającymi tlenek azotu – ich jednoczesne stosowanie może spowodować nagły spadek ciśnienia.

Lek może również wchodzić w interakcje z lekami stosowanymi w terapii HIV (inhibitory proteaz), riocyguatem, lekami alfa-adrenolitycznymi.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićm

Valinger może być przyjmowany niezależnie od pokarmu. Obfity posiłek może opóźnić działanie leku. Alkohol może zaburzać zdolność do uzyskania erekcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Valinger może powodować zaburzenia widzenia i zawroty głowy.