Venescin, żel, 40 g

Cena: 22,79 zł

Opis słownikowy

Marka	Venescin
Postać	żel
Producent	Herbapol Wrocław
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Kasztanowiec

Opis produktu

Opis Venescin, żel, 40 g

Opis

Żel Venescin zawiera wyciąg gęsty z nasion kasztanowca o zawartości 17% escyny i trokserutynę.

Skład

(100 g żelu zawiera):
Hippocastani seminis extractum spissum 11,8 g, Ekstrahent: etanol 70&
Troxerutinum 2,0 g
Substancje pomocnicze:
Carbopol 5984, glicerol, glikol propylenowy, etanol, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, wodorotlenek sodu, woda. ad 100 g

Dawkowanie

Lek do stosowania zewnętrznego: nakładać 2 razy dziennie (zaleca się stosowanie rano i wieczorem). Niewielką ilość żelu (ok. 2 cm) po nałożeniu delikatnie wcierać.

Działanie

Przyjmuje się, że produkt zawierający połączenie escyny oraz trokserutyny, wpływa na naczynia żylne m.in. zmniejszając ich przepuszczalność oraz wpływa na napięcie żylne. Żel działa przeciwobrzękowo.

Wskazania

Venescin żel stosuje się w początkowych objawach przewlekłej niewydolności żylnej (w bólu, uczuciu ciężkości i puchnięciu nóg, kurczach łydek oraz w przypadku objawów występujących po urazach (obrzęki, krwiaki).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Venescin żel:

- przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku
- na otwarte rany, błony śluzowe i obszary skóry poddane napromienieniu w radioterapii

Działania niepożądane

Lek Venescin może powodować działania niepożądane:

- podrażnienie skóry i błon śluzowych
- wystąpienie alergii
- wystąpienie pokrzywki, a także uogólnione opóźnione odczyny nadwrażliwości takie, jak kontaktowe zapalenie skóry, niekiedy odczyny natychmiastowe z pokrzywką i skurczem oskrzeli
- podrażnienie i suchość skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i karmienie piersią:
Lek Venescin żel nie powinien być stosowany w okresie ciąży i laktacji bez zasięgnięcia porady lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Nie jest znany wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.