

## Venożel, żel, 50 g

Cena: 34,99 zł



### Opis słownikowy

Postać	żel
Producent	Bausch Health
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Diklofenak, Escyna

### Opis produktu

### Informacje podstawowe Venożel, żel, 50 g

Venożel to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy. Żel zawiera 3 składniki aktywne i stosuje się go na skórę podczas leczenia m.in.: obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych, bólu towarzyszącemu chorobom kręgosłupa, stłuczeniach, zwichnięciach lub łagodnych zapaleniach stawów. Venożel można stosować u dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

### Skład Venożel, żel, 50 g

Substancjami czynnymi leku są: diklofenak sodowy, trybenozyd i escyna.

1 g żelu zawiera 12 mg diklofenaku sodowego, 10 mg trybenozydu i 5 mg escyny.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

### Działanie Venożel, żel, 50 g

Venożel posiada w składzie 3 substancje czynne i działa wielokierunkowo. Sól sodowa diklofenaku jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) i powoduje silny efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny. Trybenozyd również należy do substancji ograniczających stan zapalny oraz ból. Escyna uszczelnia naczynia krwionośne i działa silnie przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo.

oraz przeciwzapalnie.

## Wskazania Venożel, żel, 50 g

Venożel stosuje się podczas leczenia: zapalenia żył kończyn dolnych, obrzęków pooperacyjnych i pourazowych, a także obrzęków zastoinowych kończyn dolnych. Ponadto żel podaje się w: zespołach bólowych związanych z chorobami kręgosłupa, pourazowymi bólami mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania), ograniczonymi i łagodnymi postaciami zapalenia stawów.

## Dawkowanie Venożel, żel, 50 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Venożel należy stosować miejscowo na skórę. Dawkowanie Venożelu u osób dorosłych to 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, delikatnie wmasowując w leczone miejsce do całkowitego wchłonięcia. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo użyć pasek żelu o długości około 4 cm. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce, chyba, że to ręce są miejscem leczonym.

## Przeciwwskazania Venożel, żel, 50 g

Nie stosować leku u osób z alergią na diklofenak, trybenozyd, escynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania Venożelu jest: uszkodzona lub zmieniona zapalnie skóra oraz otwarte rany; trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią; występowanie napadów astmy, pokrzywki lub ostrych nieżytów nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

## Informacje dodatkowe Venożel, żel, 50 g

Venożelu nie należy używać na błony śluzowe oraz do oczu (w razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć, obficie spłukując wodą), a także pod opatrunki.

W okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium).

Venożel zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Galeria



**VENOZEL<sup>®</sup>**  
 Preparat na ból i obrzęki w nogach

PRZECIBÓLOWY • PRZECIWZAPALNY • PRZECIWOBRZĘKOWY

50 g e

lek OTC

**na ból i obrzęki nóg 50 g**

**VENOZEL<sup>®</sup>** 50 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy. **VENOZEL<sup>®</sup>** 50 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy. **VENOZEL<sup>®</sup>** 50 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



**VENOZEL<sup>®</sup>**  
 Preparat na ból i obrzęki w nogach

PRZECIBÓLOWE  
 PRZECIWZAPALNE  
 PRZECIWOBRZĘKOWE

**3 POTRÓJNE DZIAŁANIE:**

**VENOZEL<sup>®</sup>** 100 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy. **VENOZEL<sup>®</sup>** 100 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy. **VENOZEL<sup>®</sup>** 100 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**Jak działa VENOZEL ?**

- łagodzi obrzęki, w tym obrzęki zastoinowe kończyn dolnych oraz powstające po operacjach i urazach
- łagodzi ból i stan zapalny żył kończyn dolnych
- uszczelnia naczynia krwionośne



**VENOZEL<sup>®</sup>** 50 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy. **VENOZEL<sup>®</sup>** 50 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy. **VENOZEL<sup>®</sup>** 50 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**Komu poleca się VENOZEL ?**

- osobom, którym dokuczają bóle nóg i obrzęki (także obrzęki poporozkowe, porażkowe czy zastoinowe nóg)
- osobom z zapaleniem żył kończyn dolnych
- osobom narzekającym na ból i obrzęki ze względu na pracę stojącą\*



**VENOZEL<sup>®</sup>** 50 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy. **VENOZEL<sup>®</sup>** 50 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy. **VENOZEL<sup>®</sup>** 50 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**VENOZEL<sup>®</sup> SILNE uderzenie w ból i obrzęki nóg**



**VENOZEL<sup>®</sup>**  
 Preparat na ból i obrzęki w nogach

PRZECIBÓLOWY • PRZECIWZAPALNY • PRZECIWOBRZĘKOWY

100 g e

lek OTC

**duże i ekonomiczne opakowanie 100 g**

**VENOZEL<sup>®</sup>** 100 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy. **VENOZEL<sup>®</sup>** 100 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy. **VENOZEL<sup>®</sup>** 100 g (10 mg - 1 mg) g, 10 ml leku **VENOZEL<sup>®</sup>** (Zakwaszone i 3-aminobenzodiazepole) i 3-aminobenzodiazepole. Preparat przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, przeciwdrożdżycowy.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.