

Viagra Connect Max, 50 mg tabletki powlekane, 4 szt.

Cena: 66,99 zł



Opis słownikowy

Marka	Viagra Connect
Postać	tabletki
Producent	UPJOHN EESV
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Sildenafil

Opis produktu

Informacje podstawowe Viagra Connect Max, 50 mg tabletki powlekane, 4 szt.

Viagra Connect Max zawiera substancję czynną sildenafil, stosowana jest w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

Skład Viagra Connect Max, 50 mg tabletki powlekane, 4 szt.

Substancja czynna jest sildenafil (sildenafilum) w postaci cytrynianu.

Każda tabletki powlekana zawiera cytrynian sildenafilu w ilości równoważnej 50 mg sildenafilu.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroscarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, indygotyna (E 132).

Działanie Viagra Connect Max, 50 mg tabletki powlekane, 4 szt.

Viagra Connect Max wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu i zwiększa napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Wskazania Viagra Connect Max, 50 mg tabletki powlekane, 4 szt.

Lek Viagra Connect Max jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Dawkowanie Viagra Connect Max, 50 mg tabletki powlekane, 4 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletkę (50 mg) na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od wyniku, dokonanej przez lekarza, oceny skuteczności i tolerancji dawkę można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna dawka zalecana to 100 mg.

Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Nie stosować częściej niż raz na dobę. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego, po wcześniejszym pobudzeniu seksualnym.

Przeciwwskazania Viagra Connect Max, 50 mg tabletki powlekane, 4 szt.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi chorobami serca i wątroby, niskim ciśnieniem, po niedawno przebytych udarze lub zawałe, z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa) oraz jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Informacje dodatkowe Viagra Connect Max, 50 mg tabletki powlekane, 4 szt.

Należy omówić zastosowanie leku Viagra Connect Max jeśli u pacjenta występuje: niedokrwistość sierpowata, białaczka, szpiczak mnogi, anatomiczne zniekształcenie prącia, choroba Peyroniego, dolegliwości ze strony serca, choroba wrzodowa, zaburzenia krzepnięcia oraz zaburzenia czynności nerek i wątroby.

W przypadku nagłego pogorszenia lub utraty wzroku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Viagra Connect Max zawiera laktozę.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Viagra Connect Max może wchodzić w interakcje z: lekami z grupy azotanów, uwalniającymi tlenek azotu, riocyguat, z grupy alfa-adrenolityków, stosowanymi w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego oraz niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusem HIV.

Nie należy przyjmować równolegle z innym lekami zawierającymi sildenafil.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićm

Obfity posiłek może opóźnić początek działania produktu leczniczego Viagra Connect Max.

Przed zażyciem leku przeciwwskazane jest spożywanie znacznych ilości alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Viagra Connect Max nie jest przeznaczony dla kobiet.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Należy zachować ostrożność gdyż lek może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn (zawroty głowy, zaburzenia widzenia).