

# Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, 20 mg/15 ml syrop, 120 ml



Cena: 19,89 zł

## Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	Wick Pharma
Rejestracja	Lek bez recepty

## Opis produktu

### Opis Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, 20 mg/15 ml syrop, 120 ml

## Opis

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy stosowany jest w objawowym leczeniu suchego kaszlu.

## Skład

Substancją czynną w 15 ml syropu jest 20 mg dekstrometofanu bromowodorku.

Ponadto lek zawiera wodę oczyszczoną, sacharozę, glikol propylenowy, etanol 96%, miód, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy bezwodny, karmelozę sodową, polietylenu tlenek, makrogolu stearynian, sodu benzoian (E 211), aromaty,

sacharyn? sodow?,

## Dawkowanie

Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nale?y stosowa? zawsze zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta. W razie w?tpliwo?ci nale?y skontaktowa? si? z lekarzem lub farmaceut?.

Je?li lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to: M?odzie? w wieku powy?ej 14 lat i doro?li: 15 ml (zgodnie z oznaczeniem na miarce), (co odpowiada 20 mg dekstrometofanu bromowodorku) 3 razy na dob?, maksymalna dawka dobowa dawka wynosi 45 ml (co odpowiada 60 mg dekstrometofanu bromowodorku).

Przed zastosowaniem wstrz?sn??.

Aby otworzy? butelk? nale?y docisn?? nakr?tk? i w tym samym czasie przekr?ci? w kierunku wyznaczonym przez strza?k?.

Leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie nale?y stosowa? d?u?ej ni? 3 do 5 dni bez porady lekarskiej.

## Wskazania

Leczenie suchego, dra?ni?cego, nieproduktywnego kaszlu.

## Przeciwwskazania

Nie stosowa? leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dekstrometorfanu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.
- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, zahamowanie czynności układu oddechowego (depresja oddechowa), zaburzenia oddychania (niewydolność oddechowa).
- podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków poprawiających nastrój (inhibitory MAO)
- u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby.

## Działania niepożądane

Jak każdy lek, Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana następująco:

- Bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów
- Często: u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów
- Niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów
- Rzadko: u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów
- Bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów
- Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Możliwe działania niepożądane

### Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje/wstrząs anafilaktyczny, trudnościami w oddychaniu, obrzęk jamy ustnej i gardła.

### Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: senność, omamy, rozwój uzależnienia jeżeli lek jest nadużywany.

### Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, problemy żołądkowo-jelitowe, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: podczas stosowania dekstrometofanu, zgłaszano przypadki wystąpienia wysypki skórnej.

## **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Ten lek zawiera sacharozę, glukozę i fruktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Vick#MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.

Sacharoza - 15 ml zawiera 5,5 g sacharozy (cukier), co odpowiada około 0,54 jednostkom chlebowym. Pacjent powinien wziąć to pod uwagę, jeżeli znajduje się na diecie cukrzycowej.

Sód - 15 ml zawiera 1,3 mmol (30 mg sodu). Pacjent powinien wziąć to pod uwagę,

je?li znajduje si? na diecie o niskiej zawarto?ci soli.

Alkohol - Ten produkt zawiera 5% alkoholu. Je?li lek stosowany Jest zgodnie z zaleceniami, z ka?d? dawk? przyjmuje si? 0,63 g alkoholu (na 15 ml). Istnieje ryzyko dla zdrowia, mi?dzy innymi, u pacjentów z chorob? w?troby, chorob? alkoholow?, padaczk?, organiczn? chorob? mózgu, kobiet ci??arnych, karmi?cych piersi? i dzieci. Dzia?anie innych leków mo?e by? zaburzone lub nasilone.

- Nie przechowywa? w temperaturze powy?ej 25°C.
- Przechowywa? w miejscu niedost?pnym i niewidocznym dla dzieci.
- Termin wa?no?ci po pierwszym otwarciu: 3 miesi?ce.

## Stosowanie innych leków

Nale?y powiedzie? lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje stosowa?.

## Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Nale?y unika? dodatkowego spo?ywania alkoholu.

## Ci??a i karmienie piersi?

W okresie ci??y i karmienia piersi? przed zastosowaniem nale?y skontaktowa? si? z lekarzem.

## Stosowanie leku u dzieci i m?odzie?y

Nie nale¿y stosowa? u dzieci w wieku poni¿ej 14 lat.

## **Prowadzenie pojazdów i obs?uga maszyn**

Nawet je¿li stosowany jest zgodnie z zaleceniami, ten produkt leczniczy mo¿e powodowa? umiarkowane zm?czenie, przez co mo¿e zmienia? reakcje tak bardzo, ¿e zaburza zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn. Wyst?puje to szczególnie podczas jednoczesnego spo¿ywania alkoholu lub stosowaniu innych leków mog?cych zaburza? reakcje.