


# Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Cena: 7,69 zł



## Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	Medana
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Witamina A, Witamina E

## Opis produktu

### Informacje podstawowe Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Vitaminum A+E Medana to produkt leczniczy do stosowania w niedoborach witaminy A i witaminy E z takimi objawami jak: zaburzenia przemiany materii, niedowidzeniem zmierzchowym, zaburzenia odporności zmiany chorobowe nabłonków i błon śluzowych.

### Skład Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Substancjami czynnymi są: palmitynian retinolu (Retinoli palmitas) i all-rac-α-tokoferylu octan (int-rac-α-Tocopherylis acetas).

1 kapsułka zawiera 2500 IU palmitynianu retinolu i 200 mg all-rac-α-tokoferylu octanu.

Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol i woda oczyszczona.

### Działanie Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Witamina A bierze udział w wielu procesach jak: wzrost i rozwój kości, różnicowanie i utrzymanie tkanki nabłonkowej, procesy immunologiczne, funkcjonowanie narządu wzroku. Witamina A bierze udział w tworzeniu rodopsyny - barwnik decydujący o widzeniu o zmierzchu, a także w metabolizmie białek, tłuszczu, węglowodanów.

Witamina E jest przeciwutleniaczem - chroni organizm przed związkami o właściwościach utleniających. Jest również kofaktorem niektórych układów enzymatycznych.

Łączne stosowanie witamin A i E zwiększa ochronę przed wolnymi rodnikami, które odpowiadają m.in. za procesy starzenia.

## Wskazania Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Leczenie niedoborów witaminy A i witaminy E objawiających się:

niedowidzeniem zmierzchowym;  
zaburzeniami wzrostu;  
długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem;  
zaburzeniami w przemianie materii;  
zmniejszeniem odporności organizmu na zakażenia;  
zmianami chorobowymi nabłonków i błon śluzowych.

Leczenie wspomagające:

w chorobach układu krążenia (chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, zakrzepowym zapaleniu żył);  
w profilaktyce chorób, których etiologia związana jest z „wolnymi rodnikami” np. miażdżycą, chorobą niedokrwieną serca, nowotwory, szczególnie u osób przebywających w skażonym środowisku, narażonych na stres lub u palaczy;  
w profilaktyce miażdżycy naczyń;  
w retinopatii miażdżycowej i nadciśnieniowej;  
w niedokrwistości hemolitycznej;  
w cukrzycy;  
w kolagenozach.

## Dawkowanie Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.  
Młodzież powyżej 15 lat i dorośli (profilaktycznie): 1-2 kapsułki dziennie.

Schemat dawkowania w przypadku niedoborów wyznacza lekarz.

## Przeciwwskazania Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Kiedy nie stosować leku Vitaminum A + E Medana:

jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę A lub E lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,  
jeśli pacjent ma niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień);  
jeśli pacjent ma zespół złego wchłaniania ze stolcami woskowymi;  
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność lub marskość wątroby;  
jeśli pacjent ma niedrożność dróg żółciowych;  
jeśli pacjent przeszedł zespolenie jelita czczego z krętym;  
jeśli pacjentka karmi piersią.

## Informacje dodatkowe Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Lek należy stosować ostrożnie w przypadku stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych lub estrogenów.  
Należy zachować ostrożność stosując ten lek u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.  
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.  
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

#### **Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Vitaminum A+E Medana może wchodzić w interakcje z:

innymi lekami zawierającymi witaminę A,  
olejem mineralnym (ograniczenie wchłaniania witamin A i E),  
lekami przeciwzakrzepowymi,  
estrogenami,  
środkami o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, aminokwasami zawierającymi siarkę),  
żelazem (ograniczenie wchłaniania),  
izotretinoiną.

#### **Stosowanie leku z jedzeniem i pić**

Lek należy stosować w czasie lub po posiłku.

Podczas stosowania leku nie należy stosować alkoholu.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Vitaminum A + E Medana u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

#### **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży**

Lek przeznaczony jest dla dorosłych i osób powyżej 15 lat.